

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



● Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
● Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. ● Υποποτ για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
● Παρεταταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. ● Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. ● Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. ● Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Πλυνθείτε καλά με νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
- ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
- Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
- Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
- Οι εργάτες να φορούν προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια πρόσωπο.

517032651569439



10079234,15144145,GREECE

FMC

Fungiben

Myclobutanil 12,5% β/ο ● (Μυκλομπουτανίλ)
ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με
προστατευτική και θεραπευτική δράση
της ομάδας DMI's (υποομάδα τριαζολών).**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες -
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:
60514/24-02-2016

Εγγυημένη σύνθεση: Myclobutanil: 12,5% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες 87,19 % β/β

Περιεχόμενο:

250 κ.εκ.



Αρ.παρτίδας/
Ημερ. παραγωγής:
βλέπε συσκευασία

Παρασκευαστής: FMC Agricultural Solutions SA, Ισπανία
Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά: FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ,
Α. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα, Τηλ. 211 198 3903,
e-mail: Evangelos.diamantis@fmc.com

10079234,15144145,E,FUNGIBEN,125EC,0.25L,G#GR,BOOKLET,3PAGES

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	10079234	Base for Booklet	
Product SKU Description	FUNGIBEN,125EC,0.25L	Booklet	149X60
Label SKU	151443145	Number of pages (Booklet)	3
Label SKU Description	E,FUNGIBEN,125EC,0.25L,G#GR,BOOKLET,3PAGES	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: (Πεδίο εφαρμογής, στόχος, δόσεις σκευάσματος, τρόπος και χρόνος εφαρμογής, μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο).

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά): για Ωίδιο (*Sphaerotheca pannosa*, *Podosphaera tridactyla*) με εφαρμογές από το τέλος της πτώσης των πετάλων και δόση 40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 80-100
Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/σρέμμα): 60
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο): για Ωίδιο (*Uncinula necator*) και Μαύρη σήψη (*Guignardia bidwellii*) με εφαρμογές λίγο πριν από το τέλος της άνθησης και δόση 40-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100
Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/σρέμμα): 60
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου και θερμοκηπίου), **ΠΙΠΕΡΙΑ** (θερμοκηπίου): για Ωίδιο (*Leveillula taurica*) με εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής και δόση 40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100
Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/σρέμμα): 60

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ ΜΕ ΒΡΩΣΙΜΟ ΦΛΟΙΟ (Αγγούρι, κολοκύθι) - **Θερμοκηπίου, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ ΜΕ ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΟ ΦΛΟΙΟ** (Πεπόνι, Καρπούζι) - **Υπαίθρου και θερμοκηπίου:** για Ωίδιο (*Sphaerotheca fuliginea*, *Erysiphe cichoracearum*) με εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής και δόση 40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100
Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/σρέμμα): 60
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΠΟΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΘΟΦΟΡΑ (Γαρύφαλλα, Τριαντάφυλλα) - **Υπαίθρου και θερμοκηπίου:** για Ωίδιο (*Oidium spp.*, *Micosphaera spp.*, *Sphaerotheca spp.*, *Leveillula spp.*) με εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής και δόση 40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100

Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/σρέμμα): 60
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10

ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις: 1. Η δόση ανά σρέμμα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 60 κ.εκ. και ο όγκος νερού ανά σρέμμα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα. Για παράδειγμα, αν η δόση εφαρμογής είναι 80 κ.εκ./100 λίτρα νερού, τότε ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά σρέμμα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 75 λίτρα/σρέμμα.

2. Η δόση είναι ανάλογη της έντασης της προσβολής.
Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το Myclobutanil είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση της ομάδας DMI's (υποομάδα τριαζολών).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παροσκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βύτιο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως οι φιάλες με τρύπημα και τα κουτιά με οξείδιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

-Εφαρμόστε το σκεύασμα προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών

-Εφαρμόστε το σκεύασμα σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: όπως αναφέρονται στο φάσμα δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μετά την εφαρμογή του προϊόντος σε

ετήσιες καλλιέργειες, συνίσταται οι καλλιέργειες που ακολουθούν να περιοριστούν σε καρότα, λυκοτρίβωλα (lamp's lettuce), τομάτες, πιπεριές, φράουλες, πεπόνια και αγγούρια.

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην επιτρέπεται η είσοδος στις περιοχές όπου έχει γίνει εφαρμογή με το σκεύασμα πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Στα καλλωπιστικά (τριαντάφυλλα, γαρύφαλλα) συνίσταται μια δοκιμαστική εφαρμογή πριν την καθολική εφαρμογή του σκευάσματος.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικές πληροφορίες: Μην δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναισθητός. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ** έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ** (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/ στο ντους. **ΑΝ**

ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά τα μάτια με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και είναι εύκολο να γίνει και συνεχίστε το πλύσιμο. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε/ επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Αν εμφανισθεί κάποια αδιαθεσία, αμέσως μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε ελαφρές περιπτώσεις, ο παθών να μείνει υπό παρακολούθηση και κληθεί αμέσως γιατρός αν εμφανιστούν συμπτώματα. Σε βαριές περιπτώσεις, καλέστε αμέσως γιατρό ή ασθενοφόρο.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό (Αγγούρι, κολοκύθι) (Θ), Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό (πεπόνι, καρπούζι) (Υ+Θ): **7 ημέρες.** Τομάτα, Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πιπεριά θερμοκηπίου: **3 ημέρες.** Αμπέλι: **15 ημέρες.** Καλλωπιστικά: --. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και σε θερμοκρασία έως 40 °C.