



Vendetta 37,5/15 SC

Fluazinam 37,5% - Azoxystrobin 15%
(Φλουαζινάμ) - (Αζοξυστρόμπιν)
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Μυκητοκτόνο για την πατάτα

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

fluazinam 37,5% β/ο, azoxystrobin 15% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 54,3 % β/β

**Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες**

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
(ΑΑΔΑ): 60567/14.11.2016**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ /
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
βλέπε συσκευασία**

Περιεχόμενο:

500 κ.εκ.



Κάτοχος της άδειας: CHEMINOVA A/S,
Thyborøgevej 78, DK-7673, Harboøre, Dania,
Tel: +45 96909690, Fax: +45 96909691
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΦΜC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ
Λ/ Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα, Τηλ.: 211 198 3903,
Fax: 211 113 8614, E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

10079249, 15144256, GREECE



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 1,2 benzisothiazol-3(2H) one. Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: ● Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλυθείτε με νερό και σαπούνι. ● Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. ● Σε περίπτωση εισπνοής: Αν εμφανισθεί κάποια αδιαθεσία, αμέσως μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανισθούν συμπτώματα. ● Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό ή οφθαλμικό διάλυμα, ανοίγοντας περιοδικά τα βλέφαρα, μέχρι να εξαφανισθεί κάθε ίχνος χημικού. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από μερικά λεπτά και ξεπλύνετε τα μάτια ξανά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν εμφανιστεί ερεθισμός. ● Σε περίπτωση κατάποσης: Βάλτε το θύμα να ξεπλύνει το στόμα με νερό και να πει 1-2 ποτήρια νερό ή γάλα, αλλά μην προκαλέσετε εμετό. Αν προκληθεί εμετός, ξεπλύνετε πάλι το στόμα και πιείτε υγρό. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπεία συμπτωματική. Πλύση στομάχου και/ή λήψη ενεργού άνθρακα μπορεί να ληφθούν υπόψη. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

Δηλώσεις προφύλαξης: ● Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. ● Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. ● Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. ● Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. ● Μην τρώτε, πίνετε ή καννίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. ● Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. ● Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα. Να φοράτε προστατευτική φόρμα και γάντια κατά την ανάμιξη και φόρτωση. Να φοράτε προστατευτική φόρμα κατά την εφαρμογή και γάντια κατά τη διάρκεια συντήρησης ή χειρισμού του βραχίονα ψεκασμού κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. ● Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα. ● Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μπότες. ● Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. ● Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. ● Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

10079249,15144256,E,VENDETTA,525SC,0.5L,G#GR,BOOKLET, 2PAGES

	FILL IN	DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label
Product SKU	10079249	Base for Booklet
Product SKU Description	Riza 200EC,1L	Booklet
Label SKU	15144256	Number of pages (Booklet)
Label SKU Description	E,VENDETTA,525SC,0.5L,G#GR,BOOKLET, 2PAGES	2
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. Έχει διασυστηματική και διελασματική δράση που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων. Δρα παρεμποδίζοντας την κυτταρική αναπνοή (κυτόχρωμα bc1) των παθογόνων οργανισμών. Το fluazinam είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση. Παρεμποδίζει την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα των παθογόνων με δράση στη λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής: Πατάτα

Στόχος: Περονόσπορος, Αλτερνάρια.

Δόσεις σκευάσματος: 35-50 κ.εκ./στρέμμα (70-250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).

Όγκος ψεκ. υγρού: 20-50 λίτρα/στρέμμα.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογές που ξεκινούν πριν το κλείσιμο των γραμμών των φυτών έως το σχηματισμό των κονδύλων (πριν την έναρξη της ανθοφορίας) και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών ή με βάση τις προβλέψεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων όπου αυτές εφαρμόζονται.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 ανά 7 με 14 ημέρες.

Παρατηρήσεις: Να μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρησιμοποιείστε το προϊόν σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης και όχι πάνω από 3 συνεχόμενες φορές. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα περισσότερες φορές σε κάθε καλλιεργητική περίοδο, από αυτές που συνιστάται. Εφαρμόζετε το προϊόν νωρίς, όταν η πίεση της προσβολής είναι μικρή.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά (6 ώρες).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη φιάλη.

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.

Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Ξεπλύνετε τη φιάλη και ρίξτε το ξέπλυμα στο ψεκαστικό δοχείο.

Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: -

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις δόσεις και καλλιέργειες που συνιστάται και κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. ● Μερικές ποικιλίες Μηλιάς είναι ευαίσθητες στο Azoxystrobin. ● Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς. ● Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το προϊόν να μη χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πατάτα: 14 ημέρες

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό (5-30°C), και καλά αεριζόμενο μέρος, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.