



10079837_15146512_E,TRIPSOL PRO,14EW,2.5L,G#GR,M/F,BOOKLET,4PAGES

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	10079837	Base for Booklet	
Product SKU Description	TRIPSOL PRO,14EW,2.5L	Booklet	100X100
Label SKU	15146512	Number of pages (Booklet)	4
Label SKU Description	E,TRIPSOL PRO,14EW,2.5L,G#GR,M/F,BOOKLET,4PAGES	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	



ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάσης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μετακινήστε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για τουλάχιστον 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν τα ζιζάνια είναι ανθισμένα. Καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Οι χειριστές πρέπει να φορούν γάντια κατά τη διάρκεια ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής. Να φοράτε φόρμα εργασίας και γάντια κατά τη συγκομιδή του σιτηλιού.

Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: -Για Ροδακινιές, Νεκταρινιές και Δαμασκινιές: 40 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 75% ή 25 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 90% ή 15 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 95%. -Για τα Εσπεριδοειδή: 50 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 50% ή 35 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 75% ή 20 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 90% ή 15 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 95%. -Για Αμπέλια: 35 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 50 % ή 25 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 75% ή 15 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 90% ή 8 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 95%. -Για τα καλλωπιστικά: 25 μέτρων ή 15 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 50% ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 75% ή 6 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 90% ή 3 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 95%.

Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα ορθόδοξα να αφήσετε μια ανψέκαστη ζώνη προστασίας από τη μη γεωργική γη: -Για Ροδακινιές, Νεκταρινιές, Δαμασκινιές και Εσπεριδοειδή: 0 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 90% ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 50% ή 15 μέτρων χωρίς ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς. -Για αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα): 0 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 90% ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 50 % ή 10 μέτρων χωρίς ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς. -Για Καλλωπιστικά/φυτώρια (ύψος > 50 εκ.ατ.): 0 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 90% ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 50 % ή 10 μέτρων χωρίς ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς. -Για Καλλωπιστικά/φυτώρια (ύψος < 50 εκ.ατ.): 0 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς κατά 50% ή 5 μέτρων χωρίς ακροφυσία μείωσης της αερομεταφοράς.

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά **FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ**, Α. Συγγρού 348-Κτίριο Β, 17674, Καλλιθέα, Τηλ.: 211 198 3903, Fax: 211 113 8614, E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά: Κατά των Θριπών (Taeniothrips meridionalis, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips apuscticeps), των Ακάρεων (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi), της Κορύδακας (Cydia molesta, Cydia funebrana) και της Ανάσας (Anarsia lineatella) με δόση 175-250 κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) εφαρμογές έως την αρχή της άνθισης. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-120 λίτρα/στρέμμα.

Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): Κατά των Θριπών (Frankliniella occidentalis) με την εμφάνιση των πρώτων νυμφών, της Ευδεμίδας (Lobesia botrana) και της Κοχυλίδας (Eupoecilia ambiguella) με την εμφάνιση εναπόθεσης των πρώτων αυγών, των Ακάρεων (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini) και των Eriophyidae (Caleptirimerus vitis) με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών με δόση 175-250 κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.

Εσπεριδοειδή (νεαρά δένδρα, μη παραγωγικά): Κατά των Ακάρεων (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) με δόση 175-250 κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) από το τέλος της άνθισης έως την έναρξη της πτώσης των παλαιότερων φύλλων. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 75-150 λίτρα/στρέμμα.

Καλλωπιστικά και Ανθοκομικά φυτά στο έδαφος ή σε γλάστρες, Καλλωπιστικούς θάμνους και δένδρα σε φυτώρια: Κατά των Ακάρεων (Tetranychus spp.) με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών, της Λιριόμυζας (Liriodomyza spp.) με την εμφάνιση εναπόθεσης των πρώτων αυγών και των Θριπών (Frankliniella occidentalis) με την εμφάνιση των πρώτων νυμφών, με δόση 175-250 κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 75-150 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 1.

Μέγιστη δόση σκευάσματος για όλες τις καλλιέργειες: 250 κ.εκ./στρέμμα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεσθε στην ψεκασμένη περιοχή πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στα φύλλα.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Νερό και απορρυπαντικό.

Συνδυαστικότητα: Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε εναλλαγή με προϊόντα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μαργαρίτες Shasta (Leucanthemum spp.)

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά: Έως την αρχή της άνθισης. Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): 21 ημέρες. Καλλωπιστικά, Εσπεριδοειδή (νεαρά δένδρα μη παραγωγικά): Μην εφαρμόζουμε.

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε συνθήκες θερμοκρασίες.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπουνι και νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε γιατρό ή ζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως. Βάλτε το θύμα να ξεπλύνει το στόμα με νερό και να πιεί 1-2 ποτήρια νερό ή γάλα.

Προκαλέστε εμετό μόνο αν:

1. Μεγάλη ποσότητα (πάνω από μια μπουκιά) έχει καταποθεί.

2. Ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του.

3. Δεν υπάρχει άμεση ιατρική βοήθεια.

4. Δεν έχει περάσει πάνω από μια ώρα από την κατάποση. Προκαλέστε εμετό βάζοντας το δάχτυλο στο πίσω μέρος του φάρυγγα. Βάλτε το θύμα να ξεπλύνει πάλι το στόμα του και να πιεί υγρά ξανά.

Σε περίπτωση εισπνοής: Αν εμφανισθεί κάποια αδιαθεσία, αμέσως απομακρύνετε τον παθόντα από τον χώρο έκθεσης.

Ελαφρές περιπτώσεις: Ο παθών να μείνει σε παρακολούθηση. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανιστούν συμπτώματα.

Σοβαρές περιπτώσεις: Ζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως ή καλέστε ασθενοφόρο.

Συστάσεις για την ιατρική αντιμετώπιση της οξείας δηλητηρίασης: Τα πρώτα συμπτώματα οξείας δηλητηρίασης είναι κατάρπωση του νευρικού συστήματος. Υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν θάνατο από αναπνευστική ανεπάρκεια. Θα ήταν καλό να αποφεύγονται τα φάρμακα που αυξάνουν τη δραστηριότητα GABA (βαρβιτουρικά, βενζοδιαζεπίνες, βαλπροϊκό οξύ) σε ασθενείς με πιθανή δηλητηρίαση από abamectin. Το δραστικό acrinathrin, αν πέσει στο δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό παρόμοιο με το έγκαυμα από τον ήλιο. Το νερό μπορεί να παρατείνει τον ερεθισμό αντί να τον μειώσει. Το ζεστό νερό μπορεί να αυξήσει τον πόνο.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Πλύση στομάχου και/ή λήψη ενεργού άνθρακα μπορεί να ληφθούν υπόψη. Μετά την απομόλυνση, η θεραπεία πρέπει να κατευθυνθεί στον έλεγχο των συμπτωμάτων και της κλινικής κατάστασης.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777