



Fenova® Super 6,9 EW

fenoxahprop-P-ethyl 6,9 % - Cloquintocet-mexyl 3,45%
(Φενοξαπρόν-π-εθύλ) - (Χλοκιντοσετ-μεξύλ)
Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

Ζιζανιοκτόνο για το σιτάρι και το κριθάρι

Εγγυημένη σύνθεση του σκευασμάτος:

fenoxahprop-P-ethyl 6,9 % β/ο

Αντιφυτοξικός παράγοντας:

Cloquintocet-mexyl 3,45% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 93,09% β/β

**Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
(ΑΑΔΑ): 70057 / 23.10.2013**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
βλέπε συσκευασία**

Περιεχόμενο:

1 Λίτρο



5 703265 568470

**Κάτοχος της άδειας -
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:**

FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ

Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα, Τηλ.: 211 198 3903,
Τηλ.: 211 198 3903, Fax: 211 113 8614

Τα FMC, FMC logo και Fenova® Super
είναι εμπορικά δημότα της
FMC Corporation ή και θυγατρικών της.
©2021 FMC Corporation. All rights reserved.

11000367_22061166_GREECE

UFI: FDMDY-S2GH-EN44-QGCJ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Το ξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις προφύλαξης:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
- **Σε περιπτώση έπαφης με το δέρμα:** Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
- **Εάν παραπρηθεί έρεθισμός του δέρματος ή ευφραντίστε εξάνθημα:** Συμβούλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξεναρχημοποιήσετε.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Να φοράτε γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά τις διάφορες φάσεις χρήσης του σκευασμάτος.
- Δεν θα πρέπει να εισέλθετε στον αγρό που έχει ψεκαστεί πριν από 48 ώρες από την εφαρμογήν.
- Μη ρυπαΐστε τα νερά με το σκευασμά ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξόπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.)
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αμέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων.
- Για να προστατέψετε τα μη στοχευμένα φυτά να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τις γειτονικές καλλιέργειες.

Πρώτες βοήθειες:

- Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε πρεμία.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.
- **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Αφαιρέστε τους φακούς επαφής και πλυθείτε με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός και επιμείνει, καλέστε γιατρό.
- **Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο διληπτηρίσεων.
- **Πληροφορίες για το γιατρό:** Θεραπεία συμπτωματική. Εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα μετανάστησης (μεγαλύτερη από μια γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και sodium sulfate. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
- **Το σκεύασμα περιέχει ως διαλύτη αρωματικούς υδρογονάνθρακες.**

Αντίδοτο:-

- **Συμπτώματα:** Γαστρεντερικές διαταραχές, εμετός διάρροια.
- **Θεραπεία:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.
- **Αντένδειξη:** Παράγωγα της αδρεναλίνης. Παρακολούθηση λειτουργίας νεφρών, πόπας και παγκρέατος. Σε περίπτωση κατάποσης κάνετε πλύση στομάχου εφόσον έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα μόνο στις 2 πρώτες ώρες. Οστόσο, συνιστάται σε κάθε περίπτωση η χορηγήση ενεργού άνθρακα και θεικού νάτριου.
- **Εάν έχει καταποθεί ποσότητα ίσης ή μεγαλύτερης μιας γουλιάς, τα ακόλουθα μέτρα συνιστάται να ακολουθηθούν:** Εξάλεψη με διάλυση (εξαναγκασμένη αλκαλική διούρηση).

Τηλέφωνο Κέντρου Διπλητηρίσεων: 210-7793777



11000367_22061166_LBL_ML-F_1L_FENOVA SUPER 6.9EW_GR_4_BOOKLET_2PAGES

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11000367	Base for Booklet	
Product SKU Description	1L_FENOVA SUPER 6.9EW_GR_4_BOOKLET_2PAGES	Booklet	244X130
Label SKU	22061166	Number of pages (Booklet)	2
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_FENOVA SUPER 6.9EW_GR_4_BOOKLET_2PAGES	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μεταφυτωτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστώδων ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι.

Το FENOVA® SUPER 69 EW απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και τον βλαστό και μεταφέρεται στις ρίζες και τα ριζώματα. Μετά την εφαρμογή οι νεότεροι ιστοί των φύλλων γίνονται χλωρωτικοί (κίτρινοι) ή νεκρωτικοί (καφέ) και τα φύλλα αποσχίζουν εύκολα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η νέκρωση των ζιζανίων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο Εφαρμογής: Σιτάρι (σκληρό και μαλακό)

Στόχος: Αγρωστώδη ζιζανία.

Δόσεις σκεύασματος: 100-120 κ.εκ./στρέμμα (333-1200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).

Όγκος ψεκ. υγρού: 10-30 λίτρα/στρέμμα.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Μεταφυτωτική εφαρμογή από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργητη περίοδο: 1.

Πεδίο Εφαρμογής: Κριθάρι

Στόχος: Αγρωστώδη ζιζανία.

Δόσεις σκεύασματος: 100 κ.εκ./στρέμμα (333-1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).

Όγκος ψεκ. υγρού: 10-30 λίτρα/στρέμμα.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Μεταφυτωτική εφαρμογή από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργητη περίοδο: 1.

Παρατηρήσεις:

1) Το FENOVA® SUPER 6,9 EW εφαρμόζεται από το στάδιο των 2 φύλλων των ζιζανίων μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου. Ειδικά στη Φάλαρη συνιστάται να εφαρμόζεται μέχρι τα μέσα του αδελφώματος.

2) Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζανια ξεπεράσουν το στάδιο του αδελφώματος καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση της Φάλαρης.

3) Η μηνιαία ψεκάζεται όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

Ευαίσθητα ζιζανία:

Σετάρια (Setaria spp.)

Τραχεία λειβαδοπόντα (Poa trivialis)

Αλεπονούρα (Alopecurus spp.)

Αγριοβρώμη (Avena spp.)

Φάλαρη (Phalaris spp.)

Ανεμόχορτο (Apera spica-venti)

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Π.χ. Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.

Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες βρώμης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σπαράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια καλλιέργητη περίοδο μπορούν να σπαρθούν αραβόσιτος και σόργο αφού μεσολαβήσουν τρεις (3) εβδομάδες μετά την εφαρμογή του FENOVA® SUPER 6,9 EW.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος με 10-30 λίτρα νερό ανά στρέμμα με πίεση 2,5-3 atm. (38-45 PSI) και μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά τα % με νερό. Ανακινείστε καλά τη φιάλη συσκευασίας και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Στην περίπτωση που

αδειάζει η φιάλη, τότε ξεπλύνετε τρεις φορές και ρίξτε το νερό του ξεπλύματος στο δοχείο του ψεκαστικού. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: ---**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψηλαμένους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Συνδυαστικότητα: --

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Στο σιτάρι (σκληρό και μαλακό) και κριθάρι δεν βρίσκει εφαρμογή (τελευταία επέμβαση μέχρι και τον σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας).

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό (5-30°C), και καλά αεριζόμενο μέρος, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.