

Καλλιέργειες - Χρόνος εφαρμογής για διαφυλλικές εφαρμογές:

Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι), Αγκινάρα, Φράουλα και άλλοι μικροί καρποί: 250-400 κ.εκ./στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή όσο το δυνατόν νωρίτερα της καλλιεργητικής περιόδου, εφόσον υπάρχει επαρκές φύλλωμα. Οι καλλιέργειες θα επωφεληθούν από μια 2η εφαρμογή 5-6 ημέρες πριν την ανθοφορία.

Πατάτα, Καρότο, Κρεμμύδι, Σκόρδο: Εφαρμόστε 300-500 κ.εκ./στρέμμα κατά την ανάπτυξη των κονδύλων/βολβών και πραγματοποιήστε 1-3 πρόσθετες εφαρμογές κατά τη διόρκωση των κονδύλων/βολβών.

Μηλοειδή (Μήλα, Αχλάδια), Ακτινίδια, Σύκα, Πυρνόκαρπα (Βερίκοκα, Ροδάκινα, Δαμάσκηνα, Κεράσια, Νεκταρίνια), Αβοκάντο, Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλι, Μανταρίνι, Λεμόνι), Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Καστανιά), Ελιά, Αμπέλι (Επιπραπέζιο και οινοποίησμο): 300-500 κ.εκ./στρέμμα κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης και καλοκαιρινής βλαστοποίησης και επανάληψη, εάν απαιτείται σε διάστημα 15 ημερών.

Μαρούλι, Σπανάκι, Κουνουπίδι, Λάχανο: 250-350 κ.εκ./στρέμμα στα αρχικά στάδια ανάπτυξης όταν υπάρχει αρκετό φύλλωμα για την καλύτερη πρόσληψη του προϊόντος.

Βαμβάκι, Σιτρόα (Σιτάρι, Κριθάρι, Τριτικάλε, Βρώμη, Σίκαλη), Αραβόσιτος, Ζαχαρότευτλα, Ελαιούχοι σπόροι (Ηλίανθος και άλλοι ελαιούχοι σπόροι), Όσπρια (Φασόλια, Ρεβίθια, Φακές, Μπιζέλια), Πράσινα φασολάκια: 250-350 κ.εκ./στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή φυλλώματος στα αρχικά βλαστικά στάδια ανάπτυξης, όταν η καλλιέργεια έχει αρκετό φύλλωμα για την πρόσληψη του προϊόντος. Επανάληψη, εάν απαιτείται σε διάστημα 15 ημερών.

Για εφαρμογή με στάγδην άρδευση: 450-1000 κ.εκ./στρέμμα για όλες τις καλλιέργειες.

Παρατηρήσεις: Το προϊόν να μνην εφαρμόζεται όταν υπάρχει έντονο το πλιακό φως και θερμοκρασίες άνω των 25°C. Εάν είναι δυνατόν οι ψεκασμοί να γίνονται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως με τα συνήθη ψεκαστικά μέσα. Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση ανάγκης. Να μνην γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.



Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν το ανοίξετε και το χρησιμοποιήστε. Ο εξοπλισμός ψεκασμού πρέπει να είναι καθαρός. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση. Ξεπλύνετε προσεκτικά το δοχείο, προσθέστε τα ξεπλύματα στο ψεκαστικό δοχείο και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Διατηρήστε την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση.

Συνίσταται να χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων εδάφους και ιστών όποτε είναι δυνατόν, για την καθοδήγηση των εφαρμογών μίκρο και μάκρο θερπητικών συστατικών για τη βελτιστοποίηση της θερπητικής κατάστασης των καλλιέργειών.

Συνίσταται οι παραγωγοί να ενημερώνονται από τους κατά τόπους γεωπόνους, για την ορθή χρήση της εκάστοτε περίπτωσης και την αποφυγή της υπερβολικής λίπανσης.

Συνδυαστικότητα: Το λίπασμα Hi-phos είναι φυσικά και χημικά συμβατό με ένα ευρύ φάσμα αγροχημικών προϊόντων. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα των άλλων προϊόντων προτού αναμίξετε με το λίπασμα Hi-phos. Μην αναμιγνύετε το λίπασμα Hi-phos με εξαιρετικά αλκαλικά προϊόντα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, να προηγηθεί δοκιμή μικρής κλίμακας.

Συνθήκες αποθήκευσης:

Προστατέψτε από τον παγετό. Φυλάσσεται πάνω από τους 5°C. Φυλάσσεται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Μην το αποθηκεύετε σε άμεσο πλιακό φως ή κοντά σε άμεσες πηγές θερμότητας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές.

Περιεχόμενο:

5 λίτρα

11000771_22057531_GREECE