



Bo-La®

Λίπασμα

Διαφυλλικό λίπασμα βορίου και μολυβδαινίου, ειδικά διαμορφωμένο για την μεγιστούση της πρόσληψης από τα φυτά.

ΚΛΠ 1(Γ)(II)(β): ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΙΚΡΟΘΕΡΠΗΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ Μικροθερπητικό λίπασμα Βορίου (Β) και Μολυβδαινίου (Μο).

Περιεχόμενο:

Βόριο (Β) διαλυτό στο νερό: 11,0% β/β, 14,9% β/ο
Μολυβδαινίο (Μο) ως μίας νατριου, διαλυτό στο νερό: 0,55% β/β, 0,74% β/ο
Ως διάλυμα.
Συστατικά: Προϊόντα αντιδραστής της Μονοαιθανολαμίνης και του Βορικού οξείας (1:3)¹ (CAS 26038-87-9).
Όλες οι ουσίες ανήκουν στην ΙΚΣΥ 1. Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσεις.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
- Εάν παρατηρήθει ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε τον γιατρό.
- Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε τον γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλεφωνο Κέντρου Διληπτηρίασεων: 210-7793777

Περιεχόμενο:

1 λίτρο

Αρ.παρτίδας/Ημερ.παραγωγής: Αναγράφεται επί της φιάλης

Παρασκευάζεται από την: FMC Agro Ltd,
Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH,
UK. Tel: +44 (0) 1244 537370
E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com, www.fmc-agro.co.uk

Εισάγεται στην Ευρώπη από: FMC Agricultural Solutions A/S,
Thyborønvej 78, 7673 Harbøøre, Denmark. TEL: +45 (0) 96909690
και διανείμεται στην Ελλάδα από: FMC Χημικά Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε.,
Λ. Συγγρού 348, Τ.Κ: 17674, Καλαθέα, Τηλ.: 211 198 3903,
ΑΡ. ΓΕΜΗ:455701000

Τα FMC, FMC logo και Bo-La® είναι εμπορικά σήματα της
FMC Corporation ή και θυγατρικών της.
©2024 FMC Corporation. All rights reserved.

11000787_22055420_GREECE



Καλλιέργειες - Δόσεις εφαρμογής για διαφυλλικούς ψεκασμούς:

Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι), Πιπέρι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Μαρούλι, Σπανάκι, Κουνουπίδι, Λάχανο, Πράσινα φασόλια, Αγκινάρα και Καρότο: 75-150κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων ανθέων και επανάληψη με την πτώση των πετάλων.

Κρεμμύδι, Σκόρδο: 75-150κ.εκ/στρέμμα. Εξικνίστε τις εφαρμογές μετά τον σχηματισμό των βολβών.

Φράουλες και μικροί καρποί: 100-125κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή λίγο πριν την ανθοφορία και επανάληψη κατά την πτώση των πετάλων.

Μπλεσδί (Μήλα, Αχλάδια), Ακτινίδια, Σύκα: 100-150κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά το τέλος της ανθοφορίας, εάν απαιτείται.

Πυρόνικαρπα (Βερίκοκο, Ροδάκινο, Δαμάσκηνο, Κεράσι, Νεκταρίνι, Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Καστανιά): 100-150κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά το τέλος της ανθοφορίας, εάν απαιτείται.

Αβοκάντο, Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλι, Μανταρίνι, Λεμόνι), Ελιά: 100-150κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή πριν από την άνθηση, επανάληψη κατά την πτώση των πετάλων.

Αμπέλι (Επιτραπέζιο και οινοποιίσμα): 100-125κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά το τέλος της ανθοφορίας, εάν απαιτείται.

Πατάτα: 100 κ.εκ/στρέμμα από την έναρξη της άνθησης (10% των ανθέων ανοιγμένα). Επαναλάβετε την εφαρμογή εάν απαιτείται μετά από 15-20 ημέρες. Για την αύξηση του μεγέθους των κονδύλων, 300-350 κ.εκ/στρέμμα 15-20 ημέρες πριν από τη συγκομιδή και την εφαρμογή αποξηραντικού.

Βαμβάκι: 75-150κ.εκ/στρέμμα: 1^η εφαρμογή με την εμφάνιση των κτενιών, 2^η εφαρμογή στην αρχή της ανθοφορίας και 3^η εφαρμογή όταν ανοίξει το 30% των καρυδιών.

Σιτρό: Σιτρό, Κριθέρι, Τριτικάλε, Βρώμη, Σίκαλην: 75-100κ.εκ/στρέμμα. Κατά την διόγκωση του κολεού του φύλλου σημαία.

Αραβόσιτος, Ζαχαρότευτλα, Ηλίανθος και άλλοι ελαιούχοι σπόροι: 75-100 κ.εκ/στρέμμα. Εφαρμογή πριν την άνθηση.

Όσπρια (Φασόλια, Ρεβίθια, Φακές, Μπιζέλια): Συνδιαστικότητα: Το λίπασμα Bo-La® είναι φυσικά και υγρικά υποβάτα με ένα ευρύ φάσμα αγροκηπικών προϊόντων. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Πάντα να διαβάζετε προσεκτικά την επικέτα του προϊόντος συνεργάτη πριν το ανοίξετε με το λίπασμα Bo-La®.

Συνδιαστικότητα: Το λίπασμα Bo-La® είναι φυσικά και υγρικά υποβάτα με ένα ευρύ φάσμα αγροκηπικών προϊόντων. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Πάντα να διαβάζετε προσεκτικά την επικέτα του προϊόντος συνεργάτη πριν το ανοίξετε με το λίπασμα Bo-La®.

Συνδιαστικές αποδίκευση: Προστατεύετε το προϊόν από τον παγετό. Αποθηκεύτε το σε δέρμακραίς πάνω από 5°C. Διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό, καλά αεριζόμενο κατόπιν πώλησης. Μην αποθηκεύετε σε χώρους που έχουν άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε θέμες πηγές θερμότητας. Να φύλασσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από τροφίμα, ποτά και ζωστροφές.

11000787_22055420_LBL_SL-F_1L_BO-LA_GR_3

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	270x130
Product SKU	11000787	Base for Booklet	
Product SKU Description	1L_BO-LA_GR_3	Booklet	
Label SKU	22055420	Number of pages (Booklet)	
Label SKU Description	LBL_SL-F_1L_BO-LA_GR_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	