

FMC

Foskey® 80 WG

Fosetyl-Al (Φοσετύλ-αλ) 80% • Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Διασυστηματικό ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Εγγυημένη Σύθεση: Fosetyl-Al: 80% β/β, Βοηθητικές ουσίες: 17,53% β/β

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΥΑΑΤ): 60917/10.01.2020

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ****ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Περιέχει 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. ● Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: ● Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. ● Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. ● Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ● Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. ● Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την εφαρμογή. ● Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι και γάντια. ● Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. ● Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ● **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ● Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ● **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. ● **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε το σκεύασμα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Καθαρό Βάρος (Net Weight): 2,5 κιλά (Kg) e

Ημερομηνία Παραγωγής (Prod. Date): βλέπε συσκευασία (see pack)

Αριθμός Παρτίδας (Lot No.): βλέπε συσκευασία (see pack)

Κάτοχος της άδειας-Παρασκευαστής σκευάσματος: Industrial Química Key S.A.,
Avda. Cervera, s/n 25300 Tárrega, Lleida, SPAIN (Ισπανία).**Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ**
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα, Τηλ.: 211 198 3941, Fax: 211 113 8614**Αποκλειστική διάθεση:**
FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα,
Τηλ.: 211 198 3941, Fax: 211 113 8614**FMC**

11002352_10811_LBL_SL-F_2.5KG_FOSKEY 80WG_GR_2

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	212X300
Product SKU	11002352	Base for Booklet	
Product SKU Description	2.5KG_FOSKEY 80WG_GR_2	Booklet	
Label SKU	10811	Number of pages (Booklet)	
Label SKU Description	LBL_SL-F_2.5KG_FOSKEY 80WG_GR_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	



Foskey® 80 WG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση. Δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων του μύκητα και ταυτόχρονα ενισχύει τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Καλλιέργειες-Στόχος-Δόσεις-Χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών):

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέϊπ-φρουτ, Φράπα, Κίτρο, Περγαμόντο, Νεραντζιά): Δόση 300 γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (330-600 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού 110-200 λίτρα/στρ. Για **Φυτόφθορα** πρώτος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης (Απρίλιο-Μάιο), δεύτερος ψεκασμός τον Ιούλιο-Αύγουστο και τρίτος τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 30 ημέρες. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα):** Δόση 300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα/στρ. Για **Φυτόφθορα** λαιμού και ριζών πρώτος ψεκασμός την άνοιξη (Απρίλιο-Μάιο), δεύτερος ψεκασμός τον Ιούνιο-Ιούλιο και τρίτος τον Οκτώβριο κατά τον λήθαργο. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 30 ημέρες. Για **Βακτηρίωση** ψεκασμοί από την πτώση των πετάλων έως το στάδιο καρπών διαμέτρου 10mm (στάδιο καρπιδίου). Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 30 ημέρες. **ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια):** Δόση 250 γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα/στρ. Για **Περονόσπορο** ψεκασμοί που ξεκινούν από την αρχή της βλάστησης. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες. **ΤΟΜΑΤΑ αγρού και θερμοκηπίου:** Δόση 250 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 30-100 λίτρα/στρ. Για **Περονόσπορο** ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων. Μέχρι 4 εφαρμογές ανά καλλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες. **ΑΓΓΟΥΡΙ θερμοκηπίου και αγρού:** Δόση 250 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 30-100 λίτρα/στρ. Για **Περονόσπορο** ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων. Μέχρι 4 εφαρμογές ανά καλλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες. **ΦΡΑΟΥΛΑ αγρού και θερμοκηπίου:** Δόση 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Για **Φυτόφθορα λαιμού και ριζών**, προληπτικοί ψεκασμοί έως την άνθηση με όγκο ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/στρέμμα (1-3 εφαρμογές/8-10 ημέρες) και εμβάπτιση ριζώματος πριν την φύτευση με όγκο ψεκαστικού υγρού 10 λίτρα/στρέμμα με μία εφαρμογή. **ΚΟΛΟΚΥΘΙ/ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ αγρού και θερμοκηπίου:** Δόση 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (160-300 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα/στρέμμα. Για **Περονόσπορο**, προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. Μεγ. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3/8-10 ημέρες. **ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ αγρού και θερμοκηπίου:** Δόση 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (160-300 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα/στρέμμα. Για **Περονόσπορο**, προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. Μεγ. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2/8-10 ημέρες. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ αγρού και θερμοκηπίου:** Για **Φυτόφθορα**, προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος με δόση 250 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (100-120 γρ./στρέμμα) και όγκο ψεκαστικού υγρού 250-300 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 1-3/30 ημέρες. Για **Φυτόφθορα** μέσω ριζοποτίσματος με 5-10 γρ./τετ.μέτρο (100 γρ.στρέμμα) και μέγιστο αριθμό εφαρμογών 1-2/30 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. Στα Καλλωπιστικά πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Τομάτα, Αγγούρι, Κολοκύθι/Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα: **3 ημέρες**. Εσπεριδοειδή, Φράουλα (ψεκασμός φυλλώματος): **14 ημέρες**, Μηλοειδή, Μαρούλι: **15 ημέρες**, Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο): **28 ημέρες**, Φράουλα (εμβάπτιση ριζώματος), Καλλωπιστικά:-.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ: -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: 30 ημέρες, -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιέργειών.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο μετά τον ψεκασμό. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα εξαρτήματά της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να έχουν απομακρυνθεί. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνδυαστικότητα:** Δε συνιστάται η ανάμειξη του σκευάσματος με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού περάσει διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας από εφαρμογή με παραφινικό λάδι. Το προϊόν δε συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα αζώτου.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Καθαρό Βάρος (Net Weight): **2,5 κιλά (Kg)** 

Αποκλειστική Διάθεση: FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα,
Τηλ.: 211 198 3941, Fax: 211 113 8614

