



# Boron 15

Λίπασμα

## Απλό ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα

**ΚΛΠ 1(Γ)(II)(α): ΑΠΛΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ**  
Λίπασμα διαλυτότητας μικροθρεπτικών στοιχείων Βορίου (B) σε μορφή Βοριούχου αιθανολαμίνης.

Υδατοδιαλυτό Βόριο (B) 11,1 % β/β 15% β/ο  
Συστατικά: Βοριούχος αιθανολαμίνη (CAS no 10377-81-8).  
(ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών).  
Επίσης περιέχει: Άζωτο (N): 4,8% (β/β), Οργανικό άνθρακα (C<sub>org</sub>): 8,3% (β/β)

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- Το λίπασμα **Boron 15** είναι υδατοδιαλυτό σκεύασμα που περιέχει Βόριο 11,1 % β/β 15% β/ο, πλήρως διαλυτό στο νερό.
- Το Βόριο ως θρεπτικό στοιχείο συμβάλει στην ανάπτυξη των μεριστωμάτων, τη γονιμότητα της γύρης, τη σύνθεση και μεταφορά σακχάρων, στην διαχείριση της αυξίνης στο φυτό και πολλά άλλα.
- Το λίπασμα **Boron 15** περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες και διαβρεκτικούς παράγοντες για αποτελεσματική απορρόφηση από το φύλλωμα.

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον CLP (REG EC 1272/2008).  
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

Περιεχόμενο:  
**1 Λίτρο**

Αρ.παρτίδας/Ημερ.παραγωγής: Αναγράφεται επί της φιάλης  
Παρασκευάζεται από την:  
**FMC Agro Ltd**, Rectors Lane, Pentre,  
Flintshire, Ch5 2DH, UK. Tel: + 44 (0) 1244 537370  
E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com, www.fmc-agro.co.uk



Εισάγεται στην Ευρώπη από:  
FMC Agricultural Solutions A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre,  
Denmark. TEL: 45 (0) 96909690 και διανέμεται στην Ελλάδα από:  
FMC Χημικά Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε. Α. Συγγρού 348,  
Τ.Κ.: 17674, Καλλιθέα, Τηλ.: 211 198 3903

Τα FMC, FMC logo  
είναι εμπορικά σήματα  
της FMC Corporation  
ή και θυγατρικών της.  
©2020-2022 FMC Corporation.  
All rights reserved.  
11003091\_22054779\_GREECE



**ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**  
**Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι, Μαρούλι, Σπανάκι, Κουνουπίδι, Λάχανο, Πράσινο φασόλι, Αγκινάρα, Πατάτα, Καρότο:** 75-150 κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή στην έναρξη ανθοφορίας, και επανάληψη στην πτώση των πετάλων. **Κρεμμύδι, Σκόρδο:** 75-150 κ.εκ/στρέμμα. Ξεκινήστε τις εφαρμογές μετά την έναρξη της διόγκωσης του βολβού. **Φράουλα και άλλα μούρα:** 100-125 κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά το τέλος της ανθοφορίας, αν απαιτείται. **Μήλο, Αχλάδι:** 100-125 κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά το τέλος της ανθοφορίας, αν απαιτείται. **Ακτινίδιο, Σύκο:** 100-150 κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά το τέλος της ανθοφορίας, αν απαιτείται. **Βερίκοκο, Ροδάκινο, Δαμάσκηνο, Κεράσι:** 100-150 κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά το τέλος της ανθοφορίας, αν απαιτείται. **Αβokάντο:** 100-150 κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή πριν από την ανθοφορία, μπορεί να επαναληφθεί κατά την πτώση των πετάλων. **Πορτοκάλι, Μανταρίνι, Λεμόνι:** 100-150 κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή πριν από την ανθοφορία, μπορεί να επαναληφθεί κατά την πτώση των πετάλων. **Αμύγδαλο, Καρύδι, Φιστίκι, Κάστανο:** 100-150 κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά το τέλος της ανθοφορίας, αν απαιτείται. **Ελιά:** 100-150 κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή με την εμφάνιση των ανθοφόρων οφθαλμών, επανάληψη στην πτώση των πετάλων. **Οινοποίηση επιτραπέζια σταφύλι:** 100-125 κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά το τέλος της ανθοφορίας, αν απαιτείται. **Βαμβάκι:** 75-100 κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή από BBCH51 (εμφάνιση ανθοφόρων οφθαλμών, και επανάληψη ανά διαστήματα 15-20 ημερών εφόσον απαιτείται. **Σιτηρά: Σιτάρι, Κριθάρι, Τριτσάκι, Βρώμη:** 75-100 κ.εκ/στρέμμα. Εφαρμόστε από το μέσο της βλαστικής περιόδου. **Αραβόσιτος, Ζαχαρότευτλο:** 75-100 κ.εκ/στρέμμα Εφαρμόστε πριν την ανθοφορία. **Ελαιούχοι σπόροι:** Ηλιανθος και Ελαιοκράμβη: 75-100 κ.εκ/στρέμμα. Εφαρμόστε πριν την ανθοφορία. **Ψωπια: Φασόλι, Ρεβίθι, Φακή, Μπιζέλι:** 75-100 κ.εκ/στρέμμα. Εφαρμόστε στην αρχή της ανθοφορίας.

**Παρατηρήσεις:** Ο ψεκασμός αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ έχει δείξει ότι μειώνει τον κίνδυνο καψίματος Αποφύγετε τον ψεκασμό σε υψηλές θερμοκρασίες και ακραίες συνθήκες. Χαμηλότερες δόσεις κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Οι δόσεις πρέπει επίσης να συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες, τον τύπο εδάφους, τις γεωργικές πρακτικές και τις συνθήκες στρες. Για εφαρμογή μέσω στάγδην άρδευσης στα 250-350 κ.εκ/στρέμμα. Για φυλλοβόλα δένδρα, μπορεί να εφαρμοστεί σε μεταφυτεύσεις σε 150-200 κ.εκ/στρέμμα διαφυλλικά.

Το λίπασμα **Boron 15**, μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες όταν παρατηρείται ή αναμένεται έλλειψη βορίου, μετά το στάδιο των 3 φύλλων ή όταν υπάρχει επαρκές φύλλωμα για να απορροφήσει τον ψεκασμό. Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν σε πολύ έντονο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες. Εάν είναι δυνατόν, ψεκάστε αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα. Να χρησιμοποιείται μόνο όπου υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη. Μην υπερβείτε τις κατάλληλες δόσεις. Συνιστάται τα αποτελέσματα της ανάλυσης εδάφους και ιστών να χρησιμοποιούνται όποτε είναι δυνατόν για να καθοδηγήσουν τις εφαρμογές μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών συστατικών για τη βελτιστοποίηση της κατάστασης των θρεπτικών συστατικών της καλλιέργειας. Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν σε πολύ έντονο ηλιακό φως ή σε θερμοκρασίες άνω των 25°C. Αν είναι δυνατόν, οι ψεκασμοί να γίνονται νωρίς το απόγευμα ή νωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα. Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μην γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

**Οδηγίες εφαρμογής:** Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν το άνοιγμα και τη χρήση. Ο εξοπλισμός ψεκασμού πρέπει να είναι καθαρός. Τοποθετήστε στη δεξαμενή ψεκασμού νερό μέχρι τη μέση, αρχίστε την ανάδευση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του λιπάσματος **Boron 15**. Ξεπλύνετε προσεκτικά το δοχείο, προσθέστε τα ξεπλυμένα στη δεξαμενή ψεκασμού, συμπληρώστε το γέμισμα και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Διατηρήστε την ανάδευση σε όλη την έκταση. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση.

**ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Το λίπασμα **Boron 15** είναι φυσικά και χημικά συμβατό με ένα ευρύ φάσμα αγροχημικών προϊόντων Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για τις τελευταίες πληροφορίες. Διαβάστε πάντα προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος πριν από την ανάμιξη με το λίπασμα **Boron 15**. **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Προστατεύστε το προϊόν από τον παγετό. Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 5°C. Κρατήστε το σε θροσερό, καλά αεριζόμενο και κατάλληλο μέρος. Μην το αποθηκεύετε σε μέρη με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά πηγές θερμότητας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** ● **Επαφή με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν ο ερεθισμός των ματιών αναπτύσσεται ή παραμένει. ● **Επαφή με το δέρμα:** Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ένα γιατρό. ● **Εισπνοή:** Απομακρύνετε το άτομο από την έκθεση εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του ατόμου ενώ το κάνει. ● **Κατάποση:** Πλύνετε το στόμα με νερό. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

«Το παρόν σκεύασμα  
βεβαιώνεται από το Ινστιτούτο  
Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΘ  
για χρήση στη Βιολογική γεωργία»

E BORON 15,1L,F/BO,GR,FMC