



VENZAR® 80 WP

Ζιζανιοκτόνο

Lenacil 80% (Λενασίλ)
ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ

Εγγυημένη σύνθεση: Lenacil : 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες 17,95 % β/β
Αρ. εγκρ. Κυκλοφορίας: 70291/30.08.2018
Μεταφυτρωτικό Ζιζανιοκτόνο

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποπτο πρόκλησης καρκίνου.
Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα
Τηλ. 211 198 3903
Φαξ. 211 113 8614
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com



©Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
5 x 100 γρ.



Ημ/νία παρασκευής:
Ημ/νία λήξης: Αναγράφονται στο άνω μέρος της συσκευασίας.
Αρ. παρτίδας:

02-02-48 11005273_22xx_ (FRONT)_GREECE

	FILL IN		DIMENSION (WxH)
Country	GREECE GR	Single label	BAG 02-02-48
Product SKU	11005273	Base for Booklet	
Product SKU Description	VENZAR_100G_GR	Booklet	
Label SKU	22xx	Number of pages (Booklet)	
Label SKU Description	BAG_PE_5X100G_VENZAR 80WP_GR_1	Carton label	
Label SKU (earlier version)	F-01693	Preprinted Material	No

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το Venzar 80 WP είναι ένα μεταφυτρωτικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην χημική ομάδα των ουρακίλων που είναι ισχυροί άμεσοι αναστολείς της δραστηριότητας φωτοσύνθεσης σε επίπεδο χλωροπλάστη. Οι ουρακίλες εμποδίζουν την αντίδραση Hill και παρεμβαίνουν σε ένα στάδιο της φωτοσυνθετικής οδού κοντά στην εξέλιξη του οξυγόνου. Τα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνουν αποχρωματισμό των νεύρων των φύλλων ακολουθούμενη από χλώρωση, νέκρωση και τελικό θάνατο φυτών.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός εδάφους με συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Η απαιτούμενη ποσότητα συνιστάται να διαλύεται σε βυτίο γεμάτο κατά το 1/2 νερό Γεμίστε το βυτίο με το υπόλοιπο νερό. Όλη διαδικασία παρασκευής του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ (κ. εκ. σκευάσματος/στρέμμα) – ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΤΕΥΤΛΑ: Ετήσια Πλατύφυλλα και Αγρωστώδη Ζιζάνια. 62.5 κ.εκ./στρ. Πρώτο φύλλο ορατό έως ότου τα φύλλα καλύπτουν το 10% του εδάφους.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα / στρέμμα): 20-60
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών. 1 εφαρμογή στον ίδιο αγρό ανά δύο χρόνια.

Παρατηρήσεις:

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
Πλατύφυλλα (ετήσια): *Anagallis arvensis* (αναγαλλίδα) *Anthemis sp.* (ανθεμίδα), *Bilderdykia convolvulus* (αναριχ. πολύγονο), *Capsella bursapastoris* (καψέλλα), *Chenopodium album* (λουβουδιά), *Chrysanthemum segetum* (αγριομαργαρίτα), *Fumaria officinalis* (καπνόχορτο)(FUMOF), *Matricaria sp.* (χαμομήλι), *Papaver rhoeas* (κοινή παπαρούνα), *Poa annua* (κοινή πόα), *Polygonum aviculare* (πολυκόμπι), *Polygonum hydropiper* (νεροπιπεριά), *Polygonum lapathifolium* (λαπάτσα), *Polygonum persicaria* (αγριοπιπεριά), *Ranunculus arvensis* (ρανούγκουλος), *Raphanus raphanistrum* (ραπανίδα), *Rumex spp.* (λάπαθο), *Senecio vulgaris* (μαρτιάκος), *Silene vulgaris* (βοϊδοκράτης), *Sinapis arvensis* (άγριο σινάπι), *Sonchus oleraceus* (ζωχός), *Spergula arvensis* (σπεργούλα), *Stellaria media* (στελλάρια), *Thlaspi arvense* (θλάσπι), *Urtica urens* (μικρή τσουκνίδα).
Αγρωστώδη (ετήσια): *Alopecurus myosuroides* (Αλεπονουρά), *Apera spica venti* (ανεμόχορτο), *Digitaria sanguinalis* (αιματόχορτο), *Echinochloa crus galli* (μουχρίτσα).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
Να μη χρησιμοποιείται σε αμμώδη εδάφη που είναι φτωχά σε οργανική ουσία εδάφη. Διαχείριση ανθεκτικότητας. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορούν να φυτευτούν ζαχαροτεύτλα. Δεν πρέπει να γίνει άλλη εφαρμογή Ipenacil στο ίδιο αγροτεμάχιο πριν περάσουν 2 χρόνια σύμφωνα με το εγκεκριμένο φάσμα δράσης.
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μετά την παρέλευση 4 μηνών μπορούν να φυτευτούν όλες οι καλλιέργειες μετά από άροση σε βάθος 15 τουλάχιστον εκατοστών.
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Οι εργάτες να μην εισέρχονται στον ψεκασμένο αγρό πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους. Είναι πιθανό να παρατηρηθούν συμπτώματα φυτοτοξικότητας τα οποία όμως είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την απόδοση της καλλιέργειας.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με BETANAL SE (phenmedipham), GOLTIX 70 WG (metamitron), SAFARI 50 WG (δ.ο. triflusulfuron methyl). Να γίνεται συνεχής ανάδευση.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μη εφαρμόσιμο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται 3πλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα.
Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα.
Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
“Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη φόρτωση του σκευάσματος”.
“Σε περίπτωση επανεισόδου πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συνιστάται η χρήση κατάλληλων προστατευτικών γαντιών”.

Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά, μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει Ipenacil πάνω από 1 φορά ανά 2 χρόνια.
Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μια αψέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Πλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Γενικά: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό. Να προκληθεί εμετός εφόσον ο άρρωστος έχει τις αισθήσεις του.
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Οδηγείστε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν χρειαστεί να γίνει τεχνητή αναπνοή και αν δεν αναπνέει, να χορηγηθεί οξυγόνο.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύσιμο με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά τουλάχιστον και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνιστάται συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Καθαρίστε καλά τον εξοπλισμό ψεκασμού αμέσως μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε σχολαστικά και πλήρως όλες τις εσωτερικές επιφάνειες των δεξαμενών (συμπεριλαμβανομένου του καπακιού) με νερό φροντίζοντας να απομακρύνετε τυχόν ορατές αποθέσεις. Καθαρίστε την αντλία, τα φίλτρα και το βραχίονα μετά την αφαίρεση των φίλτρων, των ακροφυσίων (καθαρίστε ξεχωριστά αυτά τα εξαρτήματα). Αδειάστε το υπόλοιπο από το ξέβγαλμα στη δεξαμενή. Επαναλάβετε το ξέβγαλμα, ξεπλύνετε και αποστραγγίστε. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού. Μην καθαρίζετε κοντά σε πηγάδια και άλλες πηγές νερού.

Συνθήκες αποθήκευσης – χρονική σταθερότητα: Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια, εφόσον αποθηκεύεται στην αρχική απαρβιαστη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

02-02-48 11005273_22xx_(REAR)_GREECE