

 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210 77 93 777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ



ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ  
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ  
ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ  
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,  
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ  
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.



## GRANSTAR® 50 SG

### Ζιζανιοκτόνο

#### Υδατοδιαλυτοί κόκκοι

tribenuron-methyl (τριμπενουρόν μεθύλ) 500 g/kg

Εγγυημένη σύνθεση:

tribenuron-methyl	50 % β/β
Βοηθητικές ουσίες	47,4 % β/β

Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά (μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι), ελιά και ηλιάνθο.

\*Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της



Καθ. Βάρος:  
75 γρ. e

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 7947/16-2-2011

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:** 2 χρόνια.

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά:

**FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ**

Α. Συγγρού 348, Τ.Κ. 17674 Καλλιθέα

Τηλ.: 211 198 3903, Fax: 211 113 8614

E-mail: :Evangelos.Diamantis@fmc.com

**ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ  
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ**

ΑΡ ΠΑΡΤΙΔΑΣ  
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:  
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:

11005456\_22045378\_GREECE\_CYPUS

 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ



ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ  
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ  
ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ  
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,  
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ  
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

3 576960 033138



## GRANSTAR® 50 SG

### Ζιζανιοκτόνο

#### Υδατοδιαλυτοί κόκκοι

tribenuron-methyl (τριμπενουρόν μεθύλ) 500 g/kg

Εγγυημένη σύνθεση:

tribenuron-methyl

50 % β/β

Βοηθητικές ουσίες

47,4 % β/β

Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά (μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι), ελιά και ηλιάνθο.

\*Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της



Καθ. Βάρος:  
75 γρ. e

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 7947/16-2-2011

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:** 2 χρόνια.

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά:

**FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ**

Α. Συγγρού 348, Τ.Κ. 17674 Καλλιθέα

Τηλ.: 211 198 3903, Fax: 211 113 8614

E-mail: :Evangelos.Diamantis@fmc.com

**ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ  
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ**

11005456\_22045378\_GREECE\_CYPRUS



# GRANSTAR® 50SG

## **Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:**

Σε περίπτωση ατυχήματος: Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.



- Περιέχει tribenuron methyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

- Οι εργάτες δεν θα πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μέχρι τα φυτά να στεγνώσουν.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη.

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**

Το GRANSTAR 50 SG, είναι εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά (μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι), ελιά και ηλιάνθο. Το tribenuron-methyl δρα διασυστηματικά, απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων, μετακινείται στα ακραία μεριστώματα, βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Δρα ως παρεμποδιστής του ενζύμου συνθετάση του οξικογαλακτικού (ALS) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2,7 ατμόσφαιρες (40 psi) και συνεχή ανάδευση με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρός ψεκαστήρας. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ¼ με νερό και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και προσθέτουμε το επιφανειοδραστικό. Πραγματοποιήστε τον ψεκασμό υπό συνεχή ανάδευση. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**

**Καταπολεμούμενα ζιζάνια:**

**Σιτάρι (μαλακό και σκληρό) και Κριθάρι**

**\* Ευαίσθητα:**

μπιφόρα (*Bifora radians*), καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), αγριομαργαρίτα (*Chrysanthemum segetum*), κίρσιο (*Cirsium arvense*), μικρόκαρπη κολλητσίδα (*Galium spurium*), κοινή παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), χαμομήλι (*Chamomilla recutita*), πολυκόμμι (*Polygonum aviculare*), άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), στελλάρια (*Stellaria media*), ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), σισύμπριο (*Sisymbrium* spp.), κοινός αγριοπανσές (*Viola arvensis*).

**\* Μετρίως ευαίσθητα:**

μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine*), αγριόβικος (*Vicia* spp.).

**Ελιά****\*\* Ευαίσθητα:**

ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), καλεντούλα (*Calendula arvensis*), καψέλλα (*Capsella bursapastoris*), λουβουδιά (*Chenopodium album*), κοινή παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), πολυετής ζωχός (*Sonchus arvensis*), ζωχός (*Sonchus oleraceus*), στελλάρια (*Stellaria media*), πολυετής τσουκνίδα (*Urtica dioica*).

**\*\* Μετρίως ευαίσθητα:**

αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis*), μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine*), γεράνι (*Geranium molle*), δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*), κουφάγκαθο (*Silybum marianum*).

**Ηλιάνθος****\*\*\* Ευαίσθητα:**

δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*), κοινή παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), πλαγιαστό βλήτο (*Amaranthus blitoides*), τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), τραχύς ζωχός (*Sonchus asper*), περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*), μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), βρωμολουβουδιά (*Chenopodium vulvaria*), λουβουδιά (*Chenopodium album*), πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), σινάπι (*Sinapis* spp.), αντράκλα (*Portulaca oleracea*), πικραγγουριά (*Ecballium elaterium*), κόνυζα (*Conyza* spp.), αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*).

**\*\*\* Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**

αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis*).

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**Σιτάρι (μαλακό και σκληρό), κριθάρι:** Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων\* (ετησίων και πολυετών) συνιστάται μεταφυτρωτική εφαρμογή σε δόση 2-3 γραμ. σκ./στρέμμα μετά τα 3 φύλλα της καλλιέργειας και μέχρι την πλήρη έκπτυξη του «φύλλου σημαία».

**Ελιά:** Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων\*\* (ετησίων και πολυετών) συνιστάται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων το Φθινόπωρο ή τέλη Χειμώνα-αρχές Άνοιξης σε δόση 2,5-4 γραμ. σκ./στρέμμα αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς, τις παραφυάδες και τις μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους ελαιώνες από το τρίτο (3ο) έτος της φύτευσής τους και μετά.

**Ηλιάνθος:**

**χρησιμοποιείται μόνο σε Υβρίδια ηλιάνθου τα οποία είναι ανθεκτικά στο GRANSTAR 50 SG**

Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων\*\*\* (ετησίων και πολυετών)

συνιστάται μεταφωτρωτική εφαρμογή σε δόση 3,75 γραμ. σκ./στρέμμα όταν ο ηλιάνθος είναι στο στάδιο των 2-8 φύλλων.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο (για όλες τις καλλιέργειες): 1**

**Όγκος ψεκαστ.υγρού για όλες τις καλλιέργειες: 20-40 λίτρα νερό.**

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Στο **σιτάρι (μαλακό και σκληρό)** και στο **κριθάρι** για τα ζιζάνια μπιφόρα (*Bifora radians*), μικρόκαρπη κολλητσίδα (*Galium spurium*), μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine*), πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*) και κίρσιο (*Cirsium arvense*) να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση.
2. Στο **σιτάρι (μαλακό και σκληρό)** και στο **κριθάρι** η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.05% κατ' όγκο είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσματος στα ζιζάνια ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), μπιφόρα (*Bifora radians*), μικρόκαρπη κολλητσίδα (*Galium spurium*), μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine*), κίρσιο (*Cirsium arvense*) και αγριόβικος (*Vicia spp.*).
3. Στην **Ελιά** η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ' όγκο είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσματος.
4. Στον **Ηλιάνθο** η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ' όγκο ή CODACIDE στη δόση 125 κ.εκ/στρ είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσματος.
5. Η δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων.
6. Υγρασία του εδάφους και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν.
7. Δεν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει αφού περάσουν 2 ώρες από τον ψεκασμό.
8. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται νωρίς και τα ζιζάνια είναι μικρά και στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής τους.
9. **ΤΑ ΧΛΩΡΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ GRANSTAR 50 SG ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖΩΟΤΡΟΦΗ Η ΓΙΑ ΝΟΜΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ.**

10. Χρησιμοποιείται μόνο σε Υβρίδια ηλίανθου ανθεκτικά στο GRANSTAR 50 SG. Πριν την εφαρμογή ελέγξατε την ανθεκτικότητα των ποικιλιών ηλίανθου με τον κάτοχο της άδειας, την εταιρεία FMC

### ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Μη ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.
- Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

### Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής:

- Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μην παραμένει υπόλοιπο ψεκαστικού υγρού στο βυτίο. Γεμίστε το άδειο βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

- Μισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, προσθέστε 1 λίτρο οικιακή αμμωνία (περιεκτικότητας 3%) για κάθε 100 λίτρα νερό και απογεμίστε με καθαρό νερό.
- Γεμίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού, αφήστε να κυκλοφορήσει το διάλυμα μέσω των σωληνώσεων για τουλάχιστον 15 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε τελείως.
- Για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του διαλύματος, ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με άφθονο καθαρό νερό.
- Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά σε διάλυμα αμμωνίας ίδιας συγκέντρωσης τα μπεκ και τα φίλτρα.
- Το ψεκαστικό να μην ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.



**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ**

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Να μην ψεκάζονται σιτηρά που είναι καταπονημένα από παγετό, νεροκρατήματα, ασθένειες κ.λ.π.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**

-Σιτάρι, Κριθάρι, Ηλίανθος: Δεν ορίζεται, καλύπτεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.

-Ελιά: 28 ημέρες

Μη σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτάρι ή κριθάρι πριν περάσουν 90 μέρες από την εφαρμογή του GRANSTAR 50 SG.

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή πριν τη συγκομιδή του σπόρου.

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:**

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

**FMC**



**FMC**

