



GRANSTAR® 50 SG

Ζιζανιοκτόνο

Υδατοδιαλυτό κόκκοι

tribenuron-methyl (τριμπενουρόν μεθύλ) 500 g/kg

Εγγυημένη σύνθεση:

tribenuron-methyl

50%

β/β

Βοηθητικές ουσίες

47,4%

β/β

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Τα FMC, FMC logo και GRANSTAR® 50 SG είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της.

©2011-2023 FMC Corporation. All rights reserved.

Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά (μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι), ελιά και ηλιάνθο.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

7947/16-2-2011

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική ασυσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά:

ΦΜC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑC Μ.ΕΠΕ

Λ. Συγγρού 348, Τ.Κ. 17674 Καλλιθέα
Τηλ.: 211 198 3903, Fax: 211 113 8614



ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

UF1: 991X-82PF-7N42-C71N

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΕC ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΕΙΛΗΘΜΕΝΗ ΕΚΘΕCΗ.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕCΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑCΗ.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥC ΥΔΡΟΒΙΟΥC ΟΡΓΑΝΙCΜΟΥC, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕC ΕΠΙΠΤΩCΕΙC.

Καθαρό βάρος:

100 γρ. e



3 576960 060073 >

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑC:
ΗΜ. ΠΑΡΑCΚΕΥΗC:
ΗΜ. ΛΗΞΗC:

155/150 x 70 - 11006354_22055280_LBL_ML-F_100G_GRANSTAR 50SG_GR CY_4_BOOKLET_8pages_LEFT.indd 1

04-09-2023 13:37

P 032C P 2408C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11006354	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR 50SG_100G_GR CY	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22055280	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR 50SG_GR CY_4	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

GRANSTAR® 50SG

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Σε περίπτωση ατυχήματος: Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Μπορεί να προκαλέσει οφθαλμικό ερεθισμό. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

155/150 x 70 - 11006354_22055280_LBL_ML-F_100G_GRANSTAR 50SG_GR CY_4_BOOKLET_8pages_LEFT.indd 2

04-09-2023 13:37

BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11006354	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR 50SG_100G_GR CY	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22055280	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR 50SG_GR CY_4	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

ΠΡΟΣΟΧΗ!


ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

UFI: 991X-82PF-7N42-C71N

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ.



- Περιέχει triбенuron methyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Μην αναπνέετε σκόνη/εκνεφώματα.
- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Οι εργάτες δεν θα πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μέχρι τα φυτά να στεγνώσουν.
- Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα). Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ασφάλιστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια ασφάλιστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική/καλλιεργούμενη γη.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11006354	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR 50SG_100G_GR CY	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22055280	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR 50SG_GR CY_4	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το GRANSTAR 50 SG, είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά (μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι), ελιά και ηλίανθο. Το tribenuron-methyl δρα διασυστηματικά, απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων, μετακινείται στα ακραία μεριστώματα, βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Δρα ως παρεμποδιστής του ενζύμου συνθέτση του οξικογαλακτικού (ALS) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2,7 ατμόσφαιρες (40 psi) και συνεχή ανάδευση με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρός ψεκαστήρας. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ¼ με νερό και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και προσθέτουμε το επιφανειοδραστικό. Πραγματοποιήστε τον ψεκασμό υπό συνεχή ανάδευση.

Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**Καταπολεμούμενα ζιζάνια:****Σιτάρι (μαλακό και σκληρό) και Κριθάρι***** Ευαίσθητα:**

μπιφόρα (*Bifora radians*), καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), αγριομαργαρίτα (*Chrysanthemum segetum*), κίρσιο (*Cirsium arvense*), μικρόκαρπη κολλητσίδα (*Galium spurium*), κοινή παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), χαμομήλι (*Chamomilla recutita*), πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), στελλάρια (*Stellaria media*), ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), σισύμπριο (*Sisymbrium* spp.), κοινός αγριοπανσές (*Viola arvensis*).

*** Μετρίως ευαίσθητα:**

μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine*), αγριόβικος (*Vicia* spp.).

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11006354	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR 50SG_100G_GR CY	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22055280	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR 50SG_GR CY_4	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Ελιά**** Ευαίσθητα:**

ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), καλεντούλα (*Calendula arvensis*), καφέλλα (*Capsella bursapastoris*), λουβουδιά (*Chenopodium album*), κοινή παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), πολυετής ζωχός (*Sonchus arvensis*), ζωχός (*Sonchus oleraceus*), στελλάρινα (*Stellaria media*), πολυετής τσουκνίδα (*Urtica dioica*).

**** Μετρίως ευαίσθητα:**

αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis*), μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine*), γεράνι (*Geranium molle*), δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*), κουφάγκαθο (*Silybum marianum*).

Ηλιάνθος***** Ευαίσθητα:**

δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*), κοινή παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), πλαγιαστό βλήτο (*Amaranthus blitoides*), τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), τραχύς ζωχός (*Sonchus asper*), περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*), μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), βρωμολουβουδιά (*Chenopodium vulvaria*), λουβουδιά (*Chenopodium album*), πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), σινάπι (*Sinapis* spp.), αντράκλα

(*Portulaca oleracea*), πικραγγουριά (*Ecballium elaterium*), κόνουζα (*Conyza* spp.), αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*).

***** Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**

αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis*).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σιτάρι (μαλακό και σκληρό), κριθάρι: Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων* (ετησίων και πολυετών) συνιστάται μεταφυτρωτική εφαρμογή σε δόση 2-3 γραμ. σκ./στρέμμα μετά τα 3 φύλλα της καλλιέργειας και μέχρι την πλήρη έκπτυξη του «φύλλου σημεία».

Ελιά: Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων** (ετησίων και πολυετών) συνιστάται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων το Φθινόπωρο ή τέλη Χειμώνα-αρχές Άνοιξης σε δόση 2,5-4 γραμ. σκ./στρέμμα αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς, τις παραφυάδες και τις μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους ελαιώνες από το τρίτο (3ο) έτος της φύτευσης τους και μετά.

BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11006354	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR 50SG_100G_GR CY	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22055280	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR 50SG_GR CY_4	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Ηλιάνθος:

χρησιμοποιείται μόνο σε Υβρίδια ηλιάνθου τα οποία είναι ανθεκτικά στο GRANSTAR 50 SG

Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων*** (ετησίων και πολυετών) συνιστάται μεταφυτρωτική εφαρμογή σε δόση 3,75 γραμ. σκ./στρέμμα όταν ο ηλιάνθος είναι στο στάδιο των 2-8 φύλλων.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο (για όλες τις καλλιέργειες): 1

Όγκος ψεκαστ.υγρού για όλες τις καλλιέργειες: 20-40 λίτρα νερό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Στο **σιτάρι (μαλακό και σκληρό)** και στο **κριθάρι** για τα ζιζάνια μπιφόρα (*Bifora radians*), μικρόκαρπη κολλητσίδα (*Galium spurium*), μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine*), πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*) και κίρσιο (*Cirsium arvense*) να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση.
2. Στο **σιτάρι (μαλακό και σκληρό)** και στο **κριθάρι** η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.05% κατ' όγκο είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του

σκευάσματος στα ζιζάνια ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), μπιφόρα (*Bifora radians*), μικρόκαρπη κολλητσίδα (*Galium spurium*), μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine*), κίρσιο (*Cirsium arvense*) και αγριόβικος (*Vicia spp.*).

3. Στην **Ελιά** η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ' όγκο είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσματος.
4. Στον **Ηλιάνθο** η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ' όγκο ή CODACIDE στη δόση 125 κ.εκ/στρ είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσματος.
5. Η δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων.
6. Υγρασία του εδάφους και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν.
7. Δεν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει αφού περάσουν 2 ώρες από τον ψεκασμό.
8. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται νωρίς και τα ζιζάνια είναι μικρά και στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής τους.
9. **ΤΑ ΧΛΩΡΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ GRANSTAR 50 SG ΔΕΝ ΘΑ**

BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11006354	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR 50SG_100G_GR CY	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22055280	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR 50SG_GR CY_4	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖΩΟΤΡΟΦΗ Η ΓΙΑ ΝΟΜΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ.

10. Χρησιμοποιείται μόνο σε Υβρίδια ηλιάνθου ανθεκτικά στο GRANSTAR 50 SG. Πριν την εφαρμογή ελέγξατε την ανθεκτικότητα των ποικιλιών ηλιάνθου με τον κάτοχο της άδειας, την εταιρεία FMC

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Μη ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.
- Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής:

- Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μην παραμείνει υπόλοιπο ψεκαστικού υγρού στο βυτίο. Γεμίστε το άδειο βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό.
- Μισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, προσθέστε 1 λίτρο οικιακή αμμωνία (περιεκτικότητας 3%) για κάθε 100 λίτρα νερό και απογεμίστε με καθαρό νερό.
- Γεμίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού, αφήστε να κυκλοφορήσει το διάλυμα μέσω των σωληνώσεων για τουλάχιστον 15 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε τελείως.
- Για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του διαλύματος, ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με άφθονο καθαρό νερό.
- Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά σε διάλυμα αμμωνίας ίδιας συγκέντρωσης τα μπεκ και τα φίλτρα.
- Το ψεκαστικό να μην ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11006354	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR 50SG_100G_GR CY	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22055280	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR 50SG_GR CY_4	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

προηγούμενης με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Να μην ψεκάζονται σιτηρά που είναι καταπονημένα από παγετό, νεροκρατήματα, ασθένειες κ.λ.π.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

- Σιτάρι, Κριθάρι, Ηλιάνθος: Δεν ορίζεται, καλύπτεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.
- Ελιά: 28 ημέρες

Μη σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτάρι ή κριθάρι πριν περάσουν 90 μέρες από την εφαρμογή του GRANSTAR 50 SG.

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή πριν τη συγκομιδή του σπόρου.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11006354	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR 50SG_100G_GR CY	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22055280	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR 50SG_GR CY_4	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	