

ΕΞΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Ερωδοιάτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. - Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξης. - Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα. - Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωστροές επιφάνειες και τους δρόμους). - Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά αφήστε 2ώρες προστασίας 5 μέτρων μεταξύ του αγρού που έχει υποστεί εφαρμογή με το σκεύασμα Safari® και παρακείμενων καλλιτεργειών.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
 Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77.93.777.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

**ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
 ΚΑΡΚΙΝΟΥ.
 ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ
 ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ
 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.**



SAFARI® 50WG

Ζιζανιοκτόνο

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

triflusaluron-methyl 50% (τριφλουσουλφουρόν μεθύλ)

Εγγυημένη σύνθεση:
 triflusaluron-methyl 50 % β/β
 Βοηθητικές ουσίες 47,9 % β/β

Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε τεύτλα/κιχώρι

®Σήμα κατατεθέν της FMC Corporation ή θυγατρικών της

Καθ. Βάρος: 100 γραμ. e

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 70201/9.2.2017

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.ΠΕ

Λ. Συγγρού 348
 176 74 Καλλιθέα
 Τηλ. 211 198 3903
 Φαξ. 211 113 8614

E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com



**ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ
 ΤΟ ΕΞΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ.**

**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
 ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
 ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:**

11007328_22045529_GREECE

11007328_22045529_LBL_ML-F_100G_SAFARI 50WG_GR_1_BOOKLET,8pages.indd 1

29/05/2020 12:03



	FILL IN		DIMENSION (WxH)
Country	GREECE - GR	Single label	
Product SKU	11007328	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI 50WG 10X100G JAR GR-FMC	Booklet	195x70 mm
Label SKU	22045529	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_SAFARI 50WG_GR_1	Carton label	
Label SKU (earlier version)	F-00729	Preprinted Material	No

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. - Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. - Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα. - Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιπαστρικές επιφάνειες και τους δρόμους). - Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά αφήστε ζώνη προστασίας 5 μέτρων μεταξύ του αγρού που έχει υποστεί εφαρμογή με το σκεύασμα Safari® και παρακείμενων καλλιτεριών.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77.93.777.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.



SAFARI® 50WG

Ζιζανιοκτόνο

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

triflusalifuron-methyl 50% (τριφλουσουλφουρόν μεθόλ)

Εγγυημένη σύνθεση:

triflusalifuron-methyl	50	% β/β
Βοηθητικές ουσίες	47,9	% β/β

Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε τεύτλα/κιχώρι

® Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της

Καθ. Βάρος: 100 γραμ. e



ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 70201/9.2.2017

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ

Λ. Συγγρού 348
176 74 Καλλιθέα
Τηλ. 211 198 3903
Φαξ. 211 113 8614

E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com



**ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΟ ΕΞΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ.**

11007328_22045529_GREECE



SAFARI® 50WG

Ζιζανιοκτόνο

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

triflusaluron-methyl 50% (τριφλουσουλφουρόν μεθύλ)

Εγγυημένη σύνθεση:

triflusaluron-methyl 50 % β/β

Βοηθητικές ουσίες 47,9 % β/β

**Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
πλατύφυλλων ζιζανίων σε τεύτλα/κιχώρι**

® Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 70201/9.2.2017

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ

Λ. Συγγρού 348

176 74 Καλλιθέα

Τηλ. 211 198 3903

Φαξ. 211 113 8614

E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. - Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. - Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα. - Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). - Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά αφήνετε ζώνη προστασίας 5 μέτρων μεταξύ του αγρού που έχει υποστεί εφαρμογή με το σκεύασμα Safari® και παρακείμενων καλλιεργειών.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό. Προκαλέστε εμετό μόνον αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Μη προκαλέσετε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Μην χορηγήσετε τίποτε από το στόμα σε αναισθητό άτομο.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Χορηγήστε οξυγόνο ή κάντε τεχνητή αναπνοή αν είναι αναγκαίο. Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από σοβαρή έκθεση.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77 93777

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**

Το Safari® είναι εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφουλουριών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε τεύτλα/κίχωρι. Εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια



βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης (2-4 πραγματικά φύλλα). Η πρόσληψη της δραστηκής ουσίας γίνεται κυρίως από το φύλλωμα και σε μικρό βαθμό από την ρίζα των ζιζανίων. Διεσθύνει και μετακινείται στα φυτά γρήγορα και αναστέλλει, στα ευσίθητα φυτά, τη δράση της οξυμογλοκακτικής συνθάσης (ALS) (ομάδα HRAC B), με αποτέλεσμα την άμεση ανακοπή της ανάπτυξής τους και την καταστολή κάθε ανταγωνισμού με την καλλιέργεια. Τα ανεπιθύμητα φυτά στη συνέχεια εξαφανίζονται σταδιακά.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2,5 atm (40 psi) με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 20-50 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα, υπό συνεχή ανάδευση με μπεκ τύπου σκούπας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Η απαιτούμενη ποσότητα συνιστάται να διαλύεται σε βυτίο γεμάτο κατά το ½ νερό με συνεχή ανάδευση. Απογεμίζεται το βυτίο με νερό και προστίθεται το λάδι. Το διάλυμα πρέπει να ετοιμάζεται λίγο πριν την εφαρμογή. Σε περίπτωση ανάμειξής του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα συνιστάται πρώτα να μπαινεί το SAFARI 50 WG στο βυτίο και μετά να προστίθενται τα άλλα σκευάσματα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Εξαιρετικά ευσίθητα ζιζάνια: Αμάραντος [*Amaranthus*], Ασπροκέφαλο, Καφέλλα [*Capsella bursa-pastoris*], Λάμιο [*Lamium*], Χαμομήλι [*Matricaria*], Σκαρολόχανο [*Mercurialis annua*], Στύφνος [*Solanum nigrum*], Αναγαλλίδα η αρουραία [*Anagallis arvensis*], Αγριοραπανίδα [*Raphanus raphanistrum*], Λαπάτσα [*Persicaria lapathifolia*], Αγριοπερία [*Persicaria maculosa*], Αναβλάστηση φακελωτής, Αναβλάστηση ηλιάνθου, Αναβλάστηση τριφυλλίου, Αγριοσανάπι [*Sinapis arvensis*], Βερόνικα η περσική [*Veronica persica*]

Ευσίθητα ζιζάνια: Αθούζα [*Aethusa cynapium*], Κολητσίδα [*Galium aparine*], Ζωχί [*Sonchus*], Αγριομπυρακιά [*Abutilon theophrasti*], Τάτουλας [*Datura stramonium*]

Μετρίως ευσίθητα ζιζάνια: Άγριος πανσές [*Viola tricolor*], Πολυκόμμι (*Polygonum aviculare*), Φουμαριά [*Fumaria*] - Άγρια σίκαλη [*Fallopia convolvulus*], Κίρσιο (*Cirsium spp.*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*)

Λίγο ευσίθητα ή ανθεκτικά ζιζάνια: Σπανάκι του βουνού [*Atriplex hortensis*], Γαϊδουράγκαθο, Λουβουδιά [*Chenopodium album*] - Παπαρούνα [*Papaver rhoeas*], Στελλάρια [*Stellaria*], Βερόνικα [*Veronica hederifolia*]

Παρατήρηση:

Το πεδίο δράσης που αναφέρεται ανωτέρω, επιτυγχάνεται **για νέα ζιζάνια στο στάδιο των κοτυληδόνων έως δύο φύλλων**, μετά από δύο διαδοχικές εφαρμογές που απέχουν 6 έως 12 ημέρες, με 3 γρ./στρ Safari προθετόντας 50κ.εκ /στρ ορυκτέλαιο ή φυτικό λάδι (SUN OIL 7E, KEYNOIL EC, MOJANTE 96,8 EC , BELPROIL A, PROMANAL NEU, PROMANAL AGRO, SUPPORT 97,6 EC, NITROPOL 97,6, ECTAMPA 97,6 EC, NITROPOL-O, KEYNOIL, ONITEX, TREND 90)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ζαχαρότευτλα , Κτηνοτροφικά τεύτλα, Κοκκινόγούλια (ή Παντζάρια): Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων συνιστώνται εφαρμογές στη δόση 4-6 γρ. σκευάματος/στρέμμα στο στάδιο από τις κοτυληδόνες (1ο φύλλο ορατό) μέχρι το στάδιο του κλεισίματος των γραμμών (BBCH 10 – 39). Μέγιστη δόση ανά καλλιεργητική σεζόν: 12 γρ./στρ. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7-14 ημέρες Όγκος ψεκ. υγρού: 20-50 λίτρα/στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων κατά την εφαρμογή, έχει μεγάλη σημασία για την άριστη καταπολέμησή τους. Η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των ευαίσθητων πλατύφυλλων ζιζανίων επιτυγχάνεται όταν οι εφαρμογές γίνονται τότε που τα περισσότερα ζιζάνια έχουν φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο ζωικής ανάπτυξης (κοτυληδόνες μέχρι 2 πραγματικά φύλλα).



3. Για ταυτόχρονη αποτελεσματική καταπολέμηση και των μέτρια ευαίσθητων ή και των ανθεκτικών ζιζανίων, όταν υπάρχουν, συνιστάται το Safari® στη δόση 6 γραμμ./ στρέμμα μαζί με ορυκτέλαιο ή φυτικό λάδι * (50 κ.εκ./στρέμμα) σε μίγμα με τα άλλα εγκεκριμένα σκευάσματα.
4. Ικανοποιητική υγρασία πριν και αμέσως μετά την εφαρμογή προάγει την αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου. Κάτω από πολύ ξηρικές συνθήκες εδάφους μπορεί να παρατηρηθεί μειωμένη αποτελεσματικότητα.
5. Θερμός και υγρός καιρός μετά την εφαρμογή επιταχύνουν τη ζιζανιοκτόνο δράση, ενώ ψυχρός και ξηρός καιρός μπορεί να την επιβραδύνουν. Σε ψυχρό καιρό ή ξηρασία τα ζιζάνια μπορεί να είναι λιγότερο ευαίσθητα.
6. Η επανάληψη του ψεκασμού δεν είναι απαραίτητη αν βρέξει 6 ώρες μετά τον ψεκασμό. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του αν αναμένεται βροχή.
7. Όταν το Safari® εφαρμόζεται στο στάδιο μετά τη βλάστηση των τεύτλων (80% της βλάστησης των φυτών) σε φυτά που έχει φυτευτεί σε ασβεστολιχικό έδαφος (κιμωλία), ίσως παρατηρηθεί μια μικρή επιβράδυνση της βλάστησης. Η επιβράδυνση αυτή είναι παροδική και δεν έχει καμία επίπτωση στην απόδοση.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: BBCH 39

Πλήρης ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας. Τα φύλλα καλύπτουν το 90% του εδάφους.

Καθαρισμός ψεκαστήρα

Αμέσως μετά τον ψεκασμό: είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής: · Αδειάστε το βυτίο τελείως και γεμίστε το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Αδειάστε το ξανά. · Μισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, προσθέστε 1 λίτρο οικιακή αμμωνία ή ειδικό καθαριστικό για κάθε 100 λίτρα νερό και απογεμίστε με καθαρό νερό. · Γεμίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού, αφήστε να κυκλοφορήσει το διάλυμα μέσω των

σωληνώσεων για τουλάχιστον 15 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε τελείως. · Για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του διαλύματος, ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με άφθονο καθαρό νερό. · Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά σε διάλυμα αμμωνίας ίδιας συγκέντρωσης τα μπεκ και τα φίλτρα. · Το ψεκαστικό να μην στραγγίζεται ή ξεπλένεται σε εδάφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα

- Να αποφεύγεται η εφαρμογή με υψηλές θερμοκρασίες (άνω των 25° C) ή με θερμοκρασίες παγετού
- Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν είναι πιθανόν να παρουσιαστεί παγετός κατά τις επόμενες ώρες μετά την εφαρμογή,
- Εάν αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες εντός της ημέρας, είναι σκόπιμο η εφαρμογή να πραγματοποιείται νωρίς το πρωί ή το βράδυ, έτσι ώστε μετά την εφαρμογή να ακολουθεί μία περίοδος με μέτριες θερμοκρασίες (κάτω των 25°C),
- Μην εφαρμόζετε σε καλλιέργεια που υφίσταται δυσμενείς συνθήκες όπως: επίθεση παρασίτων, ασυξία, κακή φύτευση, τροφопενία, όξινο pH.
- Το Safari® δεν είναι πτητικό. Ωστόσο, το Safari® πρέπει να εφαρμόζεται υπό ήμερες καιρικές συνθήκες που να επιτρέπουν αποφυγή της διασποράς, ειδικά σε γειτονικές καλλιέργειες (συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών αρακά, ηλιάνθου και φασολιών, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες).

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Η επαναλαμβανόμενη χρήση στο ίδιο αγροτεμάχιο προϊόντων με τον ίδιο τρόπο δράσης μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ανθεκτικών φυτών Για να αποφευχθεί ή να καθυστερήσει το φαινόμενο αυτό, συνιστάται:

η χρήση κατάλληλων τεχνικών καλλιέργειας (αποφυγή της μονοκαλλιέργειας, εφαρμογή οργάνωματος ή/και ψευδοσπορά),



η εναλλαγή ή ο συνδυασμός, στο πλαίσιο της συντήρησης του αγροτεμαχίου και της αμειψισποράς, ζιζανιοκτόνων με διαφορετικούς τρόπους δράσης και αποτελεσματικότητας για τα στοχευόμενα είδη,

η διενέργεια, σε περίπτωση αποτυχίας της θεραπείας, μιας εφαρμογής με ένα ζιζανιοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης, η πρόληψη, στο μέτρο του δυνατού, της ανάπτυξης σπόρων στα μη ελεγχόμενα φυτά (μηχανική ή χειροκίνητη καταστροφή, εντοπισμένη επεξεργασία με ζιζανιοκτόνο).

Η δραστική ουσία του Safari®₀, το triflusalifuron-methyl, ανήκει στην οικογένεια των σουλφουλουριών (ομάδα HRAC B).

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Κάτω από ορισμένες συνθήκες μετά τον ψεκασμό μπορεί να εμφανιστούν παροδικά κτηνίσματα, αποκλειστικά και μόνο στο φύλλωμα που υπήρχε κατά τον ψεκασμό. Αυτά τα συμπτώματα δεν έχουν επίδραση στην επόμενη ανάπτυξη της καλλιέργειας ούτε στις αποδόσεις ή τον ζαχαρικό τίτλο.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με Betanal, Betanal expert, Nortron, Goltix 70 WG, Goltix 90 WG, Venzar 80 WP.

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Το Safari®₀ μπάινει πρώτο στο βυτίο και μετά να προστίθενται τα άλλα σκευάσματα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- **σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το Safari®₀, μπορεί να ξανασπαρουν μόνο τεύτλα. Η σύσταση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τη χρήση άλλων ζιζανιοκτόνων.

- **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Δεν συνιστάται η φύτευση καλλιεργειών με ανθοκομικά φυτά, διακοσμητικά φυτά, θάμνους, ή φυτώρια μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την εφαρμογή. Μη φυτεύετε φυλλώδη λαχανικά σε συνθήκες αμειψισποράς σε αγροτεμάχια που έχουν υποστεί θεραπεία μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την εφαρμογή με Safari®₀.

- **της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** 6 ώρες

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Το προϊόν να φυλάσσεται πάντοτε στην αρχική του συσκευασία, κλεισμένη, μακριά από τρόφιμα και ποτά, συμπεριλαμβανομένων και των ζωοτροφών. Να αποθηκεύεται σε χώρο που προορίζεται ειδικά για την αποθήκευση προϊόντων φυτοπροστασίας, δροσερό, στεγνό, καλά αεριζόμενο και εφοδιασμένο με κλειδαριά, προστατευμένο από παγετό και θερμότητα. Η θερμοκρασία στο χώρο αποθήκευσης δεν πρέπει να ξεπερνά τους 40οC. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 (δύο) χρόνια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας, ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.



