

FMC



SEAMAXX®

ΔΙΑΛΥΤΟ ΥΓΡΟ

Λίπασμα Νέου Τύπου.
Ομάδα ΣΤ, αριθμός κυκλοφορίας 225,
Υ.Α. 2883/133227/3-10-2018

Υγρό λίπασμα αζώτου (N 3,35% β/β) με οργανικό παράγοντα από εκχύλισμα θαλάσσιων φυκών (Ascophyllum nodosum)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εγγυημένη Σύνθεση:

Ολικό N 3,35% β/β
-Ως ουρία 2,73% β/β
-Αμμωνιακό 0,62% β/β
Φώσφορος 1,57% β/β
(ως P₂O₅ - 100% υδατοδιαλυτό)
Κάλιο 2,68% β/β
(ως K₂O - 100% υδατοδιαλυτό)
Mn 0,017% β/β
Fe 0,02% β/β
Zn 0,089% β/β
Cu 32,5 ppm β/β
B 122,8 ppm β/β
Mo 7,76 ppm β/β

Εκχύλισμα φυκών 17,85% β/β

Αρ.Πατίδας/Ημερ. Παραγωγής:
Αναγράφεται επί της συσκευασίας

Περιεχόμενο:

1 λίτρο



Εισαγωγή - Διάρθρωση:

FMC Chemicals Hellas MEPE
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα
ΤΗΛ.: 211 198 3903 - ΦΑΞ.: 211 113 8614

11008689_22054626_GREECE

Τα FMC, FMC logo και SEAMAXX®
είναι εμπορικά σήματα της
FMC Corporation ή
και θυγατρικών της.
©2022 FMC Corporation.
All rights reserved

Ηλεκτρική αγωγιμότητα 42mS/cm, pH 8-9, Αλατότητα 1,04%.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: **Χειμερινό σιτάρι, κριθάρι και βρώμη:** Εφαρμόστε 1,5 L/Ha (150 κ.εκ./στρέμμα) στο στάδιο GS 21-23 (στάδιο αδελφώματος). Επανάληψη 6 εβδομάδες μετά και ξανά στο στάδιο GS 30-31 (έναρξη επιμήκυνσης βλαστού/στελέχους). Το σιτάρι μπορεί να επωφεληθεί με περαιτέρω εφαρμογή 3 L/Ha (300 κ.εκ./στρέμμα) στο στάδιο GS 47-59 (ανάπτυξη και έκπτυξη στάκος - πριν την άνθηση). **Ανοιξιάτικο σιτάρι, κριθάρι και βρώμη:** Εφαρμόστε 1,5 L/Ha (150 κ.εκ./στρέμμα) στο στάδιο GS 21-23 (στάδιο αδελφώματος). Επανάληψη στο στάδιο GS 30-31 (έναρξη επιμήκυνσης βλαστού/στελέχους). Το σιτάρι μπορεί να επωφεληθεί με περαιτέρω εφαρμογή 3 L/Ha (300 κ.εκ./στρέμμα) στο στάδιο GS 47-59 (ανάπτυξη και έκπτυξη στάκος - πριν την άνθηση). **Ελαιοκράμβη:** Εφαρμόστε 1,5 L/Ha (150 κ.εκ./στρέμμα) αμέσως μετά τη βλάστηση, όταν υπάρχει επαρκές φύλλωμα για να απορροφήσει το ψεκαστικό υγρό. Επανάληψη 6 εβδομάδες μετά και έπειτα με μεσοδιάστημα 6 εβδομάδων. **Πατάτες:** Εφαρμόστε 1,5 L/Ha (150 κ.εκ./στρέμμα) σε ένα πρόγραμμα με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο. Οι αποποροαγωγικές ποικιλίες και οι ποικιλίες χαμηλής κονδυλοποίησης θα ωφεληθούν από μία επιπλέον εφαρμογή με 2,5 L/Ha (250 κ.εκ./στρέμμα), περίπου 10 ημέρες πριν την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων με επανάληψη κατά την έναρξη σχηματισμού τους. **Ζαχαρότευτλα:** Εφαρμόστε 4 L/Ha (400 κ.εκ./στρέμμα) στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων και επαναλάβετε δύο φορές με μεσοδιάστημα 3 εβδομάδων. **Λειμώνες:** **Χόρτο ενσίρωσης:** Εφαρμόστε 5,6 L/Ha (560 κ.εκ./στρέμμα) 28 ημέρες πριν από κάθε κοπή. **Μόνιμοι βοσκότοποι:** Εφαρμόστε 5,6 L/Ha (560 κ.εκ./στρέμμα) με μεσοδιάστημα 4-6 εβδομάδων κατά την καλλιεργητική περίοδο. **Καλαμπόκι:** Εφαρμόστε 1,5 L/Ha (150 κ.εκ./στρέμμα) στο στάδιο των 2-4 φύλλων. Επανάληψη κατά την επιμήκυνση του στελέχους και στη συνέχεια με μεσοδιάστημα 4-6 εβδομάδων, εφόσον απαιτείται. **Κηπευτικά:** Σε μεταφύτευόμενες καλλιέργειες εφαρμόστε 3 L/Ha (300 κ.εκ./στρέμμα) αμέσως μετά τη μεταφύτευση. Εφαρμόστε 300 κ.εκ./στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες με μεσοδιάστημα 3 εβδομάδων καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο. **Μηλινιά, Αχλαδιά:** Εφαρμόστε 3 L/Ha (300 κ.εκ./στρέμμα) έως και 8 φορές σε ένα πρόγραμμα καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο μέχρι τη συγκομιδή. Στη Μηλιά ξεκινήστε από το στάδιο αμέσως μετά την πράσινη κορυφή και την έκπτυξη των πρώτων πράσινων φύλλων. Στην Αχλαδιά ξεκινήστε στην πράσινη κορυφή. **Πυρηνόκαρπα:** Εφαρμόστε 3 L/Ha (300 κ.εκ./στρέμμα) έως και 5 φορές, με κανονικά μεσοδιάσματα, καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο μέχρι τη συγκομιδή. Στην Κερασιά ξεκινήστε στο στάδιο της λευκής κορυφής. Οι κερασιές μπορεί να ωφεληθούν από 3 ακόμη μετασυσλεκτικές εφαρμογές πριν την πώση των φύλλων. Στη Δαμασκηνιά ξεκινήστε στο στάδιο της πτώσης των πετάλων. **Φράουλες:** Εφαρμόστε 3 L/Ha (300 κ.εκ./στρέμμα) όσο το δυνατόν νωρίτερα, μετά τη μεταφύτευση και στη συνέχεια, με μεσοδιάστημα 3-6 εβδομάδων μέχρι το στάδιο του πράσινου καρπού. Μετά τη συλλογή, εφαρμόστε έως και 3 φορές στο «στέμμα του φυλλώματος». **Σμέουρα (Cane fruits):** Στο στάδιο του πρώτου νέου φύλλου εφαρμόστε 3 L/Ha (300 κ.εκ./στρέμμα) και συνεχίστε, με μεσοδιάστημα 2-4 εβδομάδες, μέχρι το στάδιο του πράσινου καρπού. Στις μεταφύτευόμενες καλλιέργειες, η πρώτη εφαρμογή πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά τη

μεταφύτευση. **Θαμνώδεις καρποί (Bush fruit):** Εφαρμόστε 3 L/Ha (300 κ.εκ./στρέμμα) με μεσοδιάστημα 3 εβδομάδων, ξεκινώντας από το στάδιο των νεαρών φύλλων μέχρι το άνοιγμα των ανθών (φραγκοστάφυλα ή κόκκινα φραγκοστάφυλα) ή αμέσως πριν τη συγκομιδή (φραγκοστάφυλα). **Λυκίσκος:** Εφαρμόστε 3 L/Ha (300 κ.εκ./στρέμμα) όταν ο κληματοειδής βλαστός είναι περίπου 15 εκατοστά (6 ίντσες) και επαναλάβετε μέχρι 4 φορές, σε μεσοδιάστημα 2-3 εβδομάδων, από τη στιγμή που ο κληματοειδής βλαστός φτάσει στα μισά του σπρίγματος (σύρμα, σχοινί κλπ.). **Αμπέλι:** Εφαρμόστε 3 L/Ha (300 κ.εκ./στρέμμα) στα πρώτα φύλλα και μετά ανά 2-3 εβδομάδες μέχρι τη συγκομιδή. **Βολβοί:** Εφαρμόστε 3 L/Ha (300 κ.εκ./στρέμμα) στις καταβολές των ανθοφόρων σφθαλμών και επαναλάβετε μετά την άνθηση. Αποφεύγετε τον ψεκασμό ανοιχτών ανθέων καθώς το προϊόν μπορεί να λεκιάσει τα πέταλα. **Μεταφύτευόμενες καλλιέργειες:** Οι μεταφύτευόμενες καλλιέργειες θα ωφεληθούν από εμβάπτιση ή μούλιασμα σε υδατικό διάλυμα SEAMAXX® αναλογίας 1: 3000, 24 ώρες πριν τη μεταφύτευση.

Τρόπος δράσης: Το SEAMAXX® είναι ένα διάλυμα φυσικού εκχυλίσματος θαλάσσιων φυκών Ascophyllum nodosum, πλούσιο σε φυτικές ορμόνες και άλλα οργανικά συστατικά, τα οποία διεγείρουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών, σε συνδυασμό με το Άζωτο, το Φωσφόρο και ένα προσεκτικά ισορροπημένο μίγμα μικροστοιχείων που περιέχουν, τα οποία είναι διαθέσιμα στα φυτά. Εφαρμοζόμενο την κατάλληλη χρονική περίοδο, το SEAMAXX® προκαλεί εντοπιζόμενη αύξηση στα επίπεδα των ορμονών (ιδιαίτερα των κυτοκινίνων), οι οποίες διεγείρουν τη μεταβολική παραγωγή υδατανθράκων. Η παρουσία των επιρροσθέντων N, P, K και των μικροστοιχείων βοηθά στη βελτιστοποίηση της θρεπτικής κατάστασης των φυτών κατά την περίοδο της ταχείας ανάπτυξης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού και εφαρμογής: Στις διαφυλλικές εφαρμογές, χρησιμοποιήστε επαρκή όγκο νερού 200-500 L νερού/Ha (20-50 L/στρέμμα), για τη διασφάλιση καλής κάλυψης του φυλλώματος. Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο με καθαρό νερό μέχρι τη μέση και ξεκινήστε την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα SEAMAXX® και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. Η ανάδευση συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Αποφύγετε τον ψεκασμό με πολύ έντονο ηλιακό φως ή σε θερμοκρασίες άνω των 25°C. Η χρήση σε συνδυασμό με GEOFILM ή με Headland Guard 2000 σε συγκέντρωση 0.1% ο/ο, βελτιώνει την πρόσφυση στο φύλλωμα και την αντοχή στην έκπλυση σε συνθήκες ισχυρής βροχόπτωσης.

Συνδυαστικότητα: Το SEAMAXX® συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και λιπάσματα. Συμβουλευτείτε το διαγνώμα σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες συνδυαστικότητας. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στη διεύθυνση <http://fmc-agro.co.uk>. Το SEAMAXX® δεν είναι συμβατό με θειικό μαγνήσιο, ορυκτέλαιο και έκδοχα με ελαιούχα βάση.

Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύονται σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και από πηγές θερμότητας. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ. Αποθήκευση σε θερμοκρασία άνω των 5°C.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται
στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

11008689_22054626_LBL_SL-F_1L_SEAMAXX_GR_1