



# Vercal™

## Λίπασμα

Υδατοδιαλυτό υγρό λίπασμα ασβεστίου για διαφυλλική εφαρμογή σε καρποφόρα δένδρα και άλλες καλλιέργειες.

### ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(Β)(Ι): ΑΠΛΟ ΥΓΡΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Οξειδίο του ασβεστίου (CaO): 15,9% β/β (21,1% β/ο)

Συστατικά: Χλωριούχο ασβέστιο (CAS πο 10043-52-4).

(ΚΣΥ 1. Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών).

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Το λίπασμα Vercal™ είναι πλήρως υδατοδιαλυτό υγρό λίπασμα Ασβεστίου υπό μορφή χλωριούχου ασβεστίου, για διαφυλλική εφαρμογή, για την αντιμετώπιση της ελλειψης ασβεστίου σε καρποφόρα δένδρα και άλλες καλλιέργειες.

### Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό έρεθισμό.

**Πρωτεύεις:** ● Πλύνεται τα χέρια σχλαστικά μετά το χειρισμό. ● Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα απομήκνησης προστασίας τα μάτια/πρόσωπο. ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. ● Εάν δεν υποφέρει ο οφθαλμικός έρεθισμας: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. ● Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Πρώτες βοήθειες-Αντίστοιχο:** ● **Επαφή με τα μάτια:** Κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά. Καλέστε ένα γιατρό εάν δεν υποφέρει ο έρεθισμός. ● **Επαφή με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα βαμμένα ή πτυσσαμένα ρούχα που δεν προσκολλήνται στο δέρμα. Πλύνετε αμέσως με σπαστόν και άφθονο νερό. ● **Εισπνοή:** Απομακρύνετε το όπιο από την έκθεση έξασφαλίζοντας την ασφάλεια του απόμονων ενώ το κάνετε. **Κατάσποντος:** Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗ προκαλέστε εμετό. Αν το άτομο έχει τις αισθησίες του, δώστε του να τινει 2 ποτηρία νερό. Κάντε αμέσως ιατρική έξαστη. Δεν υπάρχει ειδικό αντίστοιχο, ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 2107793777

UFI: KQ41-N3T8-5N4T-6KF3

Αρ.παρτίδας/Ημερ.παραγωγής: Αναγράφεται επί της φάιλος

## Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Εισάγεται στην Ευρώπη από: FMC Agricultural Solutions A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Denmark. TEL: 45 (0) 96909690 και διανείμεται στην Ελλάδα από: FMC Χημικά Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε. Λ. Συγγρού 348, T.K: 17674, Καλλιθέα, Τηλ.: 211 198 3903, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 455701000

Παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την:  
FMC AGRO LIMITED, Rectors Lane, Pentre,  
Flintshire, CH5 2DH, Ηνωμένο Βασίλειο  
11008732\_22055941\_GREECE



### ΠΡΟΣΟΧΗ



Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. Συμβουλευτείτε την επικέτα πιον από τη χρήση.  
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόδους ζητηθεί.

πρέπει επίσης να είναι ανάλογες με τις καρικές συνθήκες και τις συνθήκες στρες. ● Οι προτεινόμενες δόσεις μπορεί να ποικίλουν λόγω διαφορετικών τύπων εδάφους, διαφορετικών γεωργικών πρακτικών και καρικών συνθηκών. Να συμβουλεύεστε πάντα έναν τεχνικό. Το προϊόν να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει έντονο το ηλιακό φως και θερμοκρασίες άνω των 25°C. Εάν είναι δυνατόν οι ψεκασμοί να γίνονται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα.

**Εκτατικές καλλιέργειες:** Εφαρμόζεται όταν υπάρχει στρες λόγω ξηραίας εδοκικής αμέσως μετά τη γονιμοποίηση των ανθέων.

**Όγκος νερού:** Ανάλογα με το μέγεθος του δέντρου εφαρμόζεται 250-500 κ.εκ./στρέμμα από την καρποδέση έως την συγκομιδή. Τομέας: πιπεριά, μελιτάνα: 250-500 κ.εκ./στρέμμα από την καρποδέση.

**Κολοκυνθεούδη με βρώσημα και με βρώσιμο φλοιό,** μαρούλι, σπανάκι, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, αγκινάρα, φασολάκια: 250-500 κ.εκ./στρέμμα ξεκινώντας 15-20 ημέρες μετά την μεταφύτευση.

**Πατάτα, καρότο:** 250-500 κ.εκ./στρέμμα ξεκινώντας από την διόγκωση του κονδύλου και επαναληπτικά από την διόγκωση του κονδύλου και επαναληπτικά.

**Κρεμμύδι, σκόρδο, βολβός:** 250-500 κ.εκ./στρέμμα ξεκινώντας από την διόγκωση του βολβού και επανάληψη ανά 20-25 ημέρες εφόδου απαιτείται.

**Αρτελί (επιτραπέζιο, οινοποιίσμιο):** 250-500 κ.εκ./στρέμμα από την διόγκωση των οφθαλμών ως την αρχή της άνθησης και στην συνέχεια από την καρποδέση.

**Επιτραπέζιο, οινοποιίσμιο:** 250-500 κ.εκ./στρέμμα από την διόγκωση των οφθαλμών ως την αρχή της άνθησης και στην συνέχεια από την καρποδέση ανά 10 ημέρες.

Φάσοια, μικρά καρότο και μούρα (Σμέρια, Μύρτιλα, Βατόμουρα): 250-500 κ.εκ./στρέμμα από την καρποδέση έως την συγκομιδή.

**Επειροδοειδή, πτυρηνόκαρπα, συκιά, ακτινίδιο:** 250-500 κ.εκ./στρέμμα από την διόγκωση των οφθαλμών ως την αρχή της άνθησης και στην συνέχεια από την καρποδέση απωντήστε την συγκομιδή ανά 7-10 ημέρες.

**Αργίγιδα, καρύδια, φιοτίκι, καστανιά:** 250-500 κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμόζεται στην καρποδέση και επαναλήψετε τη εφαρμογή αν απατείται μετά από 15-20 ημέρες.

**Ελιά:** 250-500 κ.εκ./στρέμμα από την καρποδέση και επαναληπτικά από 20-25 ημέρες εφόδους απαιτείται.

**Βαμβάκι:** 100-150 κ.εκ./στρέμμα κατά την έναρξη της άνθησης και επαναληπτικά μετά από 7-14 ημέρες.

**Στρόφι: 75-100 κ.εκ./στρέμμα κατά την επιμήκυνση του βλαστού.**

**Αραβόστατος, χαχαρότευτλα:** 125-150 κ.εκ./στρέμμα κατά την επιμήκυνση του βλαστού.

**Ελαιούχοι στόρω, ελαιοκράμβη:** 100-150 κ.εκ./στρέμμα εφαρμογή μετά την ανθοφορία.

**Οσπρια:** Φασόλια, ρεβίθια, φακές, μπιζέλια: 75-100 κ.εκ./στρέμμα από την αρχή της άνθησης.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** ● Για εφαρμογή με στάγην δέρμευση διαστολιγία 0,7-1 λίτρο/στρέμμα. ● Αποφύγετε τον ψεκασμό σε υψηλές θερμοκρασίες και ακραίες συνθήκες. Μικρότερες δόσεις κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης. ● Οι δόσεις

πρέπει επίσης να είναι ανάλογες με τις καρικές συνθήκες και τις συνθήκες στρες. ● Οι προτεινόμενες δόσεις μπορεί να ποικίλουν λόγω διαφορετικών τύπων εδάφους, διαφορετικών γεωργικών πρακτικών και καρικών συνθηκών. Να συμβουλεύεστε πάντα έναν τεχνικό. Το προϊόν να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει έντονο το ηλιακό φως και θερμοκρασίες άνω των 25°C. Εάν είναι δυνατόν οι ψεκασμοί να γίνονται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα.

**ΑΠΟΦΗΚΕΥΣΗ:** Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 5°C. Κρατήστε το σε δροσερό μέρος, καλά αεριζόμενο και κατάλληλο μέρος. Μην το αποθηκεύετε σε μέρη με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας. Κρατείστε το ρακάρι από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωστροφές.

11008732\_22055941\_LBL\_SL-F\_1L\_VERCAL\_GR\_3