

FMC

Boron 15

Το Boron 15 είναι ένα υγρό υδατοδιαλυτό σκεύασμα υψηλής συγκέντρωσης που περιέχει Βόριο 15% β/ο (11,1% β/β) πλήρως διαλυτό στο νερό σε μορφή Βοριούχου αιθανολαμίνης.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

Βοριούχος αιθανολαμίνη
Υδατοδιαλυτό Βόριο (B) 11.1 % β/β
Περιεχόμενο: 1,35 κιλά
Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- Το **Boron 15** είναι υδατοδιαλυτό σκεύασμα που περιέχει Βόριο 15% β/ο (11,1% β/β), πλήρως διαλυτό στο νερό.
- Το **Boron 15** περιέχει το Βόριο σε μορφή Βοριούχου αιθανολαμίνης για να είναι άμεσα αφομοίωσιμο από τα φύλλα.
- Το **Boron 15** συμβάλλει στην ανάπτυξη των μεριστωμάτων, τη γονιμότητα της γύρης, τη σύνθεση και μεταφορά σακχάρων, στην διαχείριση της αυξίνης στο φυτό και πολλά άλλα.
- Το **Boron 15** περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες και διαβρεκτικούς παράγοντες για αποτελεσματική απορρόφηση από το φύλλωμα.

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον CLP (REG EC 1272/2008). Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

Περιεχόμενο:

Αρ.παρτίδας/Ημερ.παραγωγής: Αναγράφεται επί της φιάλης

1 λίτρο

(Σε χαρτοκιβώτια 12X1 λίτρο)

Παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη **FMC AGRO LIMITED**.
Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, Ηνωμένο Βασίλειο.

Διανομή:

CHEMINOVA Agro A/S Greek Branch
Λ. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα
ΤΗΛ.: 211 198 3903- ΦΑΞ.: 211 113 8614
Εταιρεία του ομίλου: FMC Corporation

15138535 / 19082020, GREECE

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι, μαρούλι, σπανάκι, κουνουπίδι, λάχανο, πράσινο φασόλι, αγκινάρα, πατάτα, καρότο: 75-150 κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή στην έναρξη ανθοφορίας, και επανάληψη στην πτώση των πετάλων. **Κρεμμύδι, σκόρδο:** 75-150 κ.εκ/στρέμμα. Ξεκινήστε τις εφαρμογές μετά την έναρξη της διόγκωσης του βολβού. **Φράουλα και άλλα μούρα:** 100-125 κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή λίγο πριν την ανθοφορία, και επανάληψη στην πτώση των πετάλων. **Μήλο, αχλάδι:** 100-125 κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά από 4-10 ημέρες εάν απαιτείται αποφεύγοντας την άνθηση. **Ακτινίδιο, σύκο:** 100-150 κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά από 4-10 ημέρες εάν απαιτείται αποφεύγοντας την άνθηση. **Βερίκοκο, ροδάκινο, δαμάσκηνο, κεράσι:** 100-150 κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά από 4-10 ημέρες εάν απαιτείται αποφεύγοντας την άνθηση. **Αβοκάντο:** 100-150 κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή πριν από την ανθοφορία, μπορεί να επαναληφθεί κατά την πτώση των πετάλων. **Πορτοκάλι, μανταρίνι, λεμόνι:** 100-150 κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή πριν από την ανθοφορία, μπορεί να επαναληφθεί κατά την πτώση των πετάλων. **Αμύγδαλο, καρύδι, φιστίκι, κάστανο:** 100-150 κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά από 4-10 ημέρες εάν απαιτείται αποφεύγοντας την άνθηση. **Ελιά:** 100-150 κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή με την εμφάνιση των ανθοφόρων οφθαλμών, επανάληψη στην πτώση των πετάλων. **Οινοποίηση επιτραπέζια σταφύλι:** 100-125 κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά από 4-10 ημέρες εάν απαιτείται αποφεύγοντας την άνθηση. **Βαμβάκι:** 75-100 κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή από BBCH51(εμφάνιση ανθοφόρων οφθαλμών, και επανάληψη ανά διαστήματα 15-20 ημερών εφόσον απαιτείται. **Σιτρά:** Σιτάρι, κριθάρι, τριτκάλε, βρώμη: 75-100 κ.εκ/στρέμμα. Εφαρμόστε από το μέσο της βλαστικής περιόδου. **Αραβόσιτος, ζαχαρότευτλο:** 75-100 κ.εκ/στρέμμα. Εφαρμόστε πριν την ανθοφορία. **Ελαιούχοι σπόροι:** ηλιάνθος και ελαιοκράμβη: 75-100 κ.εκ/στρέμμα. Εφαρμόστε πριν την ανθοφορία. **Όσπρια: Φασόλι, ρεβίθι, φακή, μπιζέλι:** 75-100 κ.εκ/στρέμμα. Εφαρμόστε στην αρχή της ανθοφορίας.

Παρατηρήσεις: Ο ψεκασμός αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ έχει δείξει ότι μειώνει τον κίνδυνο καψίματος. Αποφύγετε τον ψεκασμό σε υψηλές θερμοκρασίες και ακραίες συνθήκες. Χαμηλότερες δόσεις κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Οι δόσεις πρέπει επίσης να συνδυάζονται με τις καρκικές συνθήκες, τον τύπο εδάφους, τις γεωργικές

πρακτικές και τις συνθήκες στρες. Για εφαρμογή μέσω στάγδην άρδευσης στα 250-350 κ.εκ/στρέμμα. Για φυλλοβόλα δένδρα, μπορεί να εφαρμοστεί σε μεταφυτεύσεις σε 150-200 κ.εκ/στρέμμα διαφυλλικά.

Το **Boron 15** μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες όταν παρατηρείται ή αναμένεται έλλειψη βορίου, μετά το στάδιο των 3 φύλλων ή όταν υπάρχει επαρκές φύλλωμα για να απορροφήσει τον ψεκασμό. Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν σε πολύ έντονο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες. Εάν είναι δυνατόν, ψεκάστε το βράδυ ή νωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα.

Οδηγίες εφαρμογής: Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν το άνοιγμα και τη χρήση. Ο εξοπλισμός ψεκασμού πρέπει να είναι καθαρός. Τοποθετήστε στη δεξαμενή ψεκασμού νερό μέχρι τη μέση, αρχίστε την ανάδευση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του **Boron 15**. Ξεπλύνετε προσεκτικά το δοχείο, προσθέστε τα ξεπλύματα στη δεξαμενή ψεκασμού, συμπληρώστε το γέμισμα και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Διατηρήστε την ανάδευση σε όλη την έκταση. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το **Boron 15** είναι φυσικά και χημικά συμβατό με ένα ευρύ φάσμα αγροχημικών προϊόντων. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για τις τελευταίες πληροφορίες. Διαβάστε πάντα προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος πριν από την ανάμιξη με **Boron 15**.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Προστατεύστε το προϊόν από τον παγετό. Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 5°C. Κρατήστε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο και κατάλληλο μέρος. Μην το αποθηκεύετε σε μέρη με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά πηγές θερμότητας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ●Επαφή με τα μάτια:

Ξεπλύνετε τα μάτια με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν ο ερεθισμός των ματιών αναπτύσσεται ή παραμένει. ●Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ένα γιατρό.

●Εισπνοή: Απομακρύνετε το άτομο από την έκθεση εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του ατόμου ενώ το κάνετε. ●Κατάποση: Πλύνετε το στόμα με νερό.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777