

Coragen® 20SC

Εντομοκτόνο

Το Coragen® στα ακρόδρυα με μια ματιά

Το Coragen® 20SC είναι ένα νέας γενιάς εντομοκτόνο, το οποίο συνδυάζει την υψηλή αποτελεσματικότητα, το πολύπλευρο τρόπο δράσης και τη σταθερότητα σε αντίξοες συνθήκες με ένα σύγχρονο τοξικολογικό και περιβαλλοντικό προφίλ. Αποτελεί την πρότασή μας για αξιόπιστη φυτοπροστασία, κατάλληλη για προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης (IPM).

Δραστική ουσία	chlorantraniliprole (Rynaxypyr®) 20% β/ο
Τυποποίηση	Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Συσκευασία	Πλαστικές φιάλες 200 & 500ml

Καλλιέργειες	Στόχοι	Δόση εφαρμογής (ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού)	Όγκος ψεκ. υγρού	PHI*
Καρυδιά	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>)	18-20	100-150 (λίτρα/στρέμ.)	21
Καστανιά	Καρπόκαψα (<i>cydia fagiglandan</i>)			
	Κολεόπτερα (σκαθάρι) (<i>Curculio elephas</i>)			
Αμυγδαλιά	Ανάρσια (<i>Anarsia Lineatella</i>)			

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

*Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Άλλες χρήσεις

Είναι επίσης εγκεκριμένο για την καταπολέμηση του Πράσινου σκουληκιού, της Σποντόπτερας και του Ακανθώδους σκουληκιού σε Βαμβάκι, της Καρπόκαψας, Φυλλοδετών, Φυλλορυκτών και Οστρίνιας σε Μήλα & Αχλάδια, της Καρπόκαψας, Ανάρσιας στα Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Βερίκοκα, της Γκραφολίτας στα Δαμάσκηνα, του Φυλλοκνίστη σε Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Λεμόνια, Σατσούμα, Γκρέιπ-Φρούτ, της Ευδεμίδας και Κογχυλίδας στο Αμπέλι, του Δορυφόρου και της Φθοριμαίας στην Πατάτα, της Πυραλίδας, Σεζάμιας, Πράσινου σκουληκιού και Σποντόπτερας στο Καλαμπόκι & Γλυκό Καλαμπόκι, της Φθοριμαίας και του Πράσινου σκουληκιού στον Καπνό, της Καρπόκαψας, των Φυλλοδετών, της Οστρίνιας και των Φυλλορυκτών στην Κυδωνιά.

Πολύτιμος σύμμαχος
για την προστασία
των ακρόδρυων

Coragen® 20SC
Εντομοκτόνο

powered by
RYNAXYPYR®
active ingredient

Το Coragen® (Κόρατζεν) είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση της Καρπόκαψας στην καρυδιά, της Καρπόκαψας και του Σκαθαριού στην καστανιά και της Ανάρσιας στην αμυγδαλιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Coragen® 20SC

Εντομοκτόνο

Coragen® 20 SC - με στόχο την υψηλή προστασία

Το **Coragen® 20SC**, χάρη στην καινοτόμο δραστική ουσία Rynaxypyr®, συνδυάζει ένα πλήθος ιδιοτήτων ιδιαίτερα σημαντικών για την προστασία των ακρόδρυων από σημαντικούς & επιζήμιους εχθρούς:

- Υψηλή αποτελεσματικότητα που σχετίζεται με το συνδυασμό της δράσης του σε προνύμφες αλλά και σε αυγά και ακμαία σύμφωνα με νεότερα δεδομένα.
- Άμεση προστασία της καλλιέργειας μετά την εφαρμογή γιατί προκαλεί την σχεδόν ακαριαία παύση της διατροφής των προνυμφών.
- Σταθερή αποτελεσματικότητα που δεν επηρεάζεται από αντίξοες συνθήκες θερμοκρασίας και έντασης φωτός.
- Αποτελεσματικό ακόμη και σε πληθυσμούς ανθεκτικούς σε παλαιότερα μη εκλεκτικά εντομοκτόνα καθώς ανήκει σε νέα χημική ομάδα με μοναδικό τρόπο δράσης.
- Σημαντική αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή εξαιτίας της ισχυρής προσκόλλησής του στο φύλλο και της μεταφοράς του στο εσωτερικό της επιδερμίδας.
- Σύγχρονο περιβαλλοντικό και τοξικολογικό προφίλ.



Σεβασμός στα ωφέλιμα έντομα

Με βάση τη χαμηλή του επίδραση* σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ωφελίμων εντόμων, το **Coragen® 20SC** μπορεί να αποτελέσει βασικό συστατικό ενός προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης (IPM) σε καλλιέργειες καστανιάς, καρυδιάς & αμυγδαλιάς.

Ωστόσο, κατά την περίοδο ανθοφορίας των καλλιεργειών να μην εφαρμόζεται το προϊόν κατά τα διαστήματα της ημέρας που οι επικονιαστές δραστηριοποιούνται έντονα. Σε αυτή την περίπτωση οι εφαρμογές να λαμβάνουν χώρα νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

* Πηγή: FMC και ανεξάρτητοι επιστημονικοί φορείς




Coragen® 20SC

Εντομοκτόνο

Αποτελεσματικότητα

Το **Coragen® 20SC** με την σταθερά υψηλή αποτελεσματικότητά του, ελέγχει τους σημαντικότερους εχθρούς των ακρόδρυων και αποτελεί το βασικότερο όπλο σε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.

Πειραματισμός της FMC σε διάφορες χώρες καταδεικνύει την υψηλή προστασία που παρέχει η εφαρμογή του **Coragen® 20SC**.



Τοποθέτηση

Εφαρμογές όταν ξεκινά η διόγκωση των περικαρπίων έως το στάδιο όπου το 70% έχει ωριμάσει (BBCH 73-87). Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους.

Επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες.

Οι ψεκασμοί για την 2η γενιά καταστέλλουν την δράση του *Ragoletis completa*.

Ελάχιστη δόση/στρέμμα 18 κ.εκ.

Δεν απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής αν βρέξει 2 ώρες μετά τον ψεκασμό.