




Όλα όσα χρειάζεσαι για τον έλεγχο ζιζανίων στο καλαμπόκι

Πλήρεις λύσεις ζιζανιοκτονίας

Είτε σε προφυτρωτικές εφαρμογές, είτε σε μεταφυτρωτικές, η FMC έχει τις λύσεις για κάθε επαγγελματία παραγωγό καλαμποκιού διαθέτοντας 4 καταξιωμένα προϊόντα για την καταπολέμηση ενός μεγάλου φάσματος αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους χρήσης και τα καταπολεμούμενα ζιζάνια, παρακαλούμε αναφερθείτε στις ετικέτες των προϊόντων.



Μάρτιος 2019

CHEMINOVA AGRO A/S GREEK BRANCH
Λεωφόρος Α. Συγγρού 348, Κτίριο Β
ΤΚ 17674, Τηλ.: 211 1983941

©2019 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all brand names, company names, service marks, logos and trade names of FMC or its subsidiaries, affiliates or licensors are trademarks or registered trademarks of FMC Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.



Όλα όσα χρειάζεσαι για τον έλεγχο ζιζανίων στο καλαμπόκι....

....Μόνο από την FMC

Koban®, Loop®
Border®, Diniro®
Ζιζανιοκτόνα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Όλα όσα χρειάζεσαι για τον έλεγχο ζιζανίων στο καλαμπόκι... Μόνο από την FMC

Σε κάθε χωράφι καλαμποκιού, οι ανάγκες για την αποτελεσματική καταπολέμηση ζιζανίων διαφέρουν. Δεν υπάρχει μια λύση για όλα τα προβλήματα και δυστυχώς ούτε μια και μοναδική χρονική στιγμή για την ιδανική καταπολέμηση. Ο παραγωγός καλαμποκιού για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες ζιζανιοκτονίας, χρειάζεται στη διάθεσή του μια γκάμα προϊόντων που αλληλοσυμπληρώνονται και δίνουν λύση σε οποιοσδήποτε συνθήκες. Στην FMC διαθέτουμε 4 πολυδύναμα και καταξιωμένα προϊόντα για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο καλαμπόκι, τόσο σε προφυτρωτικές, όσο και σε μεταφυτρωτικές εφαρμογές:

KOBAN® Tx (pethoxamid 30% β/ο + terbuthylazine 18,75% β/ο)

Ευέλικτο στην εφαρμογή, απόλυτο στο αποτέλεσμα

Το Koban® Tx είναι ζιζανιοκτόνο για προφυτρωτική και μεταφυτρωτική εφαρμογή στο καλαμπόκι. Καταπολεμά ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. Είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών, των pethoxamid και terbuthylazine. Το pethoxamid είναι ένα διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο, που απορροφάται από τις ρίζες, τα κολεόπτιλα και τους νέους οφθαλμούς. Δρά παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων μακράς αλυσού, ανακόπτοντας την κυτταρική διάσπαση. Το terbuthylazine απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και τα κολεόπτιλα και μεταφέρεται στους χλωροπλάστες όπου δρα παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση. Οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και τα ικανοποιητικά επίπεδα υγρασίας ευνοούν την απορρόφηση του προϊόντος.

Παράθυρο εφαρμογής: Προφυτρωτικά (μετασπαρτικά), ή νωρίς μεταφυτρωτικά (1-4 φύλλα).

Δόση: 300 - 400 κ.εκ./στρέμμα.



LOOP® 24SC (nicosulfuron 24% β/ο)

Διαχρονική καταξιωμένη λύση, τώρα και στην πυκνή της μορφή

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες καλαμποκιού. Το nicosulfuron ανήκει στην ομάδα των σουλφονουλουριών και δρα αναστέλλοντας τη δράση του ενζύμου ALS (ακετυλολακτάση) το οποίο έχει κάρδιο ρόλο στην ανάπτυξη του φυτού όντας απαραίτητο για τη βιοσύνθεση σημαντικών αμινοξέων.

Παράθυρο εφαρμογής: 2 - 8 φύλλα καλαμποκιού.

Δόση: 17 - 25 κ.εκ./στρέμμα.

BORDER® 10 SC (mesotrione 10% β/ο)

Η δοκιμασμένη λύση για τα πλατύφυλλα

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων στο καλαμπόκι. Το Border® 10 SC περιέχει το δραστικό συστατικό mesotrione το οποίο ανήκει στην ομάδα των Τρικετονών. Δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD. Απορροφάται ταχέως κυρίως από το φύλλωμα και μεταφέρεται στα αναπτυσσόμενα μέρη. Σε διάστημα 5 έως 7 ημερών θα εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα λεύκανσης των ζιζανίων. Πλήρης καταστροφή επέρχεται μετά από 14 ημέρες.

Παράθυρο εφαρμογής: 2 - 8 φύλλα καλαμποκιού.

Δόση: 50 - 150 κ.εκ./στρέμμα.



DINIRO® 4/40/10 WG (prosulfuron 4% β/β, dicamba 40% β/β, nicosulfuron 10% β/β)

Τριπλό μίγμα για ολοκληρωτική μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία

Το DINIRO® WG είναι μεταφυτρωτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο καλαμπόκι. Όλα τα δραστικά συστατικά του απορροφούνται από τις ρίζες, τα φύλλα και τους βλαστούς και μεταφέρονται σε όλο το φυτό παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του. Συγκεκριμένα το dicamba απορυθμίζει την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των κυττάρων του φυτού ενώ το nicosulfuron και το prosulfuron εμποδίζουν την κυτταρική διαίρεση. Τα nicosulfuron και prosulfuron εμφανίζουν και υπολειμματική δράση.

Παράθυρο εφαρμογής: 2 - 8 φύλλα καλαμποκιού.

Δόση: 40 - 50 γρ./στρέμμα.