

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ**

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Μην τρώετε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
- Φοράτε γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση του σκευάσματος. Φοράτε γάντια και αλόωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή διάθεση του περιεχομένου/περιεκτι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Μην απορρίπτετε νερά που προέρχονται από αεροστεγάχα που έχουν υποστεί εφαρμογή σε κανάλια που απέχουν λιγότερο από 1 χλμ. από μόνιμα υδάτινα ρεύματα. Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους τηρείτε από τις γειτονικές καλλιέργειες:
 - μην αφέκαστε ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή
 - μην αφέκαστε ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίου μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή
 - μην αφέκαστε ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίου μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

ΠΡΟΣΟΧΗ**FMC****GULLIVER® WG****Ζιζανιοκτόνο****Azimsulfuron (αζιμουλφουρόν): 50%****Βρέξιμο κόκκοι (WG)**

Εγγυημένη σύνθεση: Azimsulfuron: 50 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 48,98 % β/β

Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες ρυζιού.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

© Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της

Καθ. Βάρος: 80 γραμ ε

F-04380/31906 - GREECE

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**Αρ. εγκρ. κυκλοφορίας: 70286/ 04.07.2018**

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια τουλάχιστον από την παρασκευή του.

**Κάτοχος της άδειας:** FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ

ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμτζή 24, 17671 Αθήνα
ΤΗΛ.: 211 198 3903 FAX: +30 211 1097209
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμτζή 24, 17671 Αθήνα
ΤΗΛ.: 211 198 3903 FAX: +30 211 1097209
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

**ΑΡ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: / ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΗΜ. ΑΝΗΣ:**



ΠΟΥΛ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
- Φοράτε γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτιση του σκευάσματος. Φοράτε γάντια και αλόσμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Μην απορρίψετε νερά που προέρχονται από αγροτεχνάγχα που έχουν υιοτεεί εφαρμογή σε κανάλια που απέχουν λιγότερο από 1 χλμ. από μόνιμα υδάτινα ρεύματα. Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους τηρείτε από τις γειτονικές καλλιέργειες:
 - μην αφέκαστε ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή
 - μην αφέκαστε ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή
 - μην αφέκαστε ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

ΠΡΟΣΟΧΗ**FMC****GULLIVER® WG****Ζιζανιοκτόνο****Azimsulfuron (αζιμουλφουρόν): 50%****Βρέξιμο κόκκοι (WG)**

Εγγυημένη σύνθεση: Azimsulfuron: 50 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 48,98 % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες ρυζιού.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

® Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αρ. εγκρ. κυκλοφορίας: 70286/ 04.07.2018

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια τουλάχιστον από την παρασκευής του.

**Κάτοχος της άδειας:** FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ

ΕΔΡΑ: Μαϊνάνδρου 15, 11528 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμετζή 24, 17671 Αθήνα
ΤΗΛ.: 211 98 3903 FAX: +30 211 1097209
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
ΕΔΡΑ: Μαϊνάνδρου 15, 11528 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμετζή 24, 17671 Αθήνα
ΤΗΛ.: 211 98 3903 FAX: +30 211 1097209
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

3 576960 012027

Καθ. Βάρος: 80 γραμ e**F-04380/31906 - GREECE**

GULLIVER® WG

Ζιζανιοκτόνο

Azimsulfuron (αζιμσουλφουρόν): 50%

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Azimsulfuron: 50 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 48,98 % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες ρυζιού.

**ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

*Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της

Αρ. εγκρ. κυκλοφορίας: 70286/ 04.07.2018

Κάτοχος της άδειας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ

ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα

ΤΗΛ.: 211 198 3903 FAX: +30 211 1097209

E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ

ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα

ΤΗΛ.: 211 198 3903 FAX: +30 211 1097209

E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ**Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:****Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.**Σε περίπτωση επαφής με τα το δέρμα:** Πλύντε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό, για αρκετά λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό. Να μην προκληθεί εμετός χωρίς ιατρική συμβουλή. Καλέστε αμέσως γιατρό. Να μην χορηγηθεί τίποτε σε αναισθητό άτομο.**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777****ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ**

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο
 - Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος. Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 - Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
- Μην απορρίπτετε νερά που προέρχονται από αγροτεμάχια που έχουν υποστεί εφαρμογή σε κανάλια που απέχουν λιγότερο από 1 χλμ. από μόνιμα υδάτινα ρεύματα.
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους τηρείτε από τις γειτονικές καλλιέργειες:
- μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή
 - μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή
 - μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το GULLIVER είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων και στη συνέχεια μετακινείται στα σημεία ανάπτυξής τους. Αμέσως μετά την απορρόφησή του από τα ζιζάνια, σταματά η ανάπτυξη και ο ανταγωνισμός τους με την καλλιέργεια του ρυζιού. Τα συμπτώματα είναι ορατά 10-15 περίπου μέρες μετά την εφαρμογή, σαν τυπικό κίτρινισμα, νέκρωση και σταδιακός θάνατος των ζιζανίων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (πεδίο εφαρμογής, στόχος, δόσεις, όγκος ψεκ. υγρού, μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

Ρύζι: Κατά των Αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων με δόση 4-5 γρ/στρέμμα:

Ευαίσθητα ζιζάνια Άλισμα το αγρωστιδόμορφον (*Alisma lanceolatum*) Αμάνια (*Ammannia coccinea*) Βούτομο (*Butomus umbellatus*) Ετερανθήρα (*Heteranthera limosa*) Λινδέρνια (*Lindernia dubia*)

Κύπερη κίτρινη (*Cyperus esculentus*) (*Cyperus serotinus*) Μοσοκούπερη (*Cyperus difformis*) Μουχρίτσες (*Echinochloa* sp.) Πεντάνευρο ρυζιού (*Alisma plantago-aquatica*) Ραγάζι ή Βολβόσχοινο (*Scirpus (Bolboschoenus) maritimus*) Σκίρπος ορυζώνων (*Scirpus (Schoenoplectus) mucronatus*) Ψαθί (*Typha* sp.)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια (Ετερανθήρα (*Heteranthera reniformis*) Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/ στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μεταφυτρωτική εφαρμογή 18 ως 50 ημέρες μετά την σπορά (καλλιέργεια στα 2 φύλλα έως τέλος του αδελφώματος {BBCH 12 – 29})

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Με σκοπό την εξασφάλιση της καλύτερης αποτελεσματικότητας του ζιζανιοκτόνου μετά την εφαρμογή του GULLIVER είναι απαραίτητη η κατάλληλη διαχείριση του νερού του ορυζώνα ως εξής:
 - Εφαρμογή σε πλημμυρισμένα τηγάνια (5-10 cm βάθος νερού): Μην απομακρύνετε το νερό για τουλάχιστον 5-7 ημέρες μετά την εφαρμογή.
 - Εφαρμογή σε έδαφος κορεσμένο νερού : Απομακρύνετε το νερό 1-3 ημέρες πριν την εφαρμογή αφήνοντας νερό βάθους 0 - 2 cm – Εφαρμόστε το σκευάσμα, μην απομακρύνετε το νερό και μην επανεισάγετε νερό όσο το επιτρέπει η καλλιέργεια και πάντως όχι πριν περάσουν 2-5 ημέρες μετά την εφαρμογή.
 - Σε περίπτωση βροχής, κατά την διάρκεια της εφαρμογής ή εντός 6 ωρών από την εφαρμογή, μπορεί να μειωθεί η αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου.
 - Επειδή το GULLIVER έχει μικρή υπολειμματική διάρκεια, η ζιζανιοκτόνος δράση του αφορά μόνο τα ζιζάνια που είναι παρόντα κατά την στιγμή της εφαρμογής.
 - Για την άριστη αποτελεσματικότητα του σκευάσματος συνιστάται η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ' όγκο.
2. Για την *Echinochloa crus-galli*, *Echinochloa* sp. η εφαρμογή να γίνεται όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 1- 4 φύλλων και πάντα πριν το αδελφωμα.
3. Για όλα τα λοιπά μονοκοτυλήδονα μη αγρωστώδη και δικοτυλήδονα ζιζάνια (σπόροι και ρίζωμα) στο στάδιο του 1 φύλλου μέχρι των 4-6 φύλλων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το προϊόν περιέχει αναστολέα του ενζύμου οξυγαλακτικής συνθετάσης (ALS) (ομάδα Β της ταξινόμησης HRA). Με στόχο την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης και εξάπλωσης ανθεκτικών ζιζανίων, ιδίως αγρωστωδών, συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων που έχουν

διαφορετικό τρόπο δράσης και η χρήση κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών (π.χ. προετοιμασία αμειψισποράς και επιφανειακής σποράς). Να μη χρησιμοποιείται το GULLIVER σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ή ισχυρισμοί περί ανθεκτικότητας ή ανοχής σε αναστολείς του ενζύμιου ALS.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: -

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση 1-2 ατμόσφαιρες με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους με 20-40 λίτρα νερού/στρέμμα και μπεκ τύπου σκούπας. Αποφύγετε την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζεται το βυτίο του ψεκαστικού κατά το 1/4 με νερό. Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος προστίθεται στο βυτίο με συνεχή ανάδευση. Η απαιτούμενη ποσότητα επιφανειοδραστικού προστίθεται πάντοτε μετά την προσθήκη του GULLIVER. Απογεμίζετε το βυτίο με νερό και η ανάδευση συνεχίζεται τόσο κατά την διάρκεια του ψεκασμού, όσο και κατά τα τυχόν διαλείμματα. Το ψεκαστικό διάλυμα θα πρέπει να ετοιμάζεται λίγο πριν την εφαρμογή του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής: 1. Αδειάστε το βυτίο τελείως και γεμίστε το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε το βυτίο και τη μπάρα με καθαρό νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά και αδειάστε τελείως. 2. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό. Προσθέστε διάλυμα καθαρισμού 0.5 λίτρα αμμωνίας για οικιακή χρήση (6%) για κάθε 100 λίτρα νερό. Αφήστε το διάλυμα

να κυκλοφορήσει μέσω της αντλίας, μπάρας και μπεκ για τουλάχιστον 15 λεπτά, με συνεχή ανάδευση. Αδειάστε ξανά. 3. Επαναλάβετε άλλη μια φορά το 2. 4. Γεμίστε τελείως το βυτίο με καθαρό νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά, οδηγώντας το νερό να περάσει από την αντλία και την μπάρα. 5. Φίλτρα και μπεκ πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται χωριστά σε ένα δοχείο που περιέχει το διάλυμα καθαρισμού (στην ίδια συγκέντρωση που αναφέρεται στο σημείο 2). Ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Το ψεκαστικό να μην στραγγίζεται ή ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε εδάφη που εφαρμόστηκε GULLIVER, συνιστάται να σπέρνονται την επόμενη καλλιεργητική περίοδο μόνο ρύζι, καλαμπόκι ή σόγια. Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να σπαρθεί μόνο ρύζι, αφού προηγηθεί επιφανειακή κατεργασία του εδάφους στις 21 μέρες μετά την εφαρμογή του GULLIVER.
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχετε πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Μην ψεκάξετε με το σκεύασμα αν επικρατούν ή πρόκειται να επικρατήσουν τις επόμενες του ψεκασμού μέρες, υψηλές θερμοκρασίες ή αν το εύρος θερμοκρασιών μεταξύ ημέρας και νύχτας είναι μεγαλύτερο από 12 °C.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το GULLIVER WG είναι εκλεκτικό στις γνωστές καλλιεργούμενες ποικιλίες ρυζιού τύπου indica ή jaronica που βρίσκονται σε καλή βλαστική κατάσταση. Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες που υποφέρουν από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, τροφωπενίες ή προσβολές εντόμων ή ασθενειών. Κάτω από ορισμένες κλιματολογικές συνθήκες μπορεί να εμφανιστούν ελαφρά κίτρινίσματα ή καθυστέρηση της ανάπτυξης. Τα συμπτώματα αυτά είναι παροδικά και δεν έχουν καμιά επίδραση στις αποδόσεις. Συνιστάται να πραγματοποιείτε προκαταρκτικές δοκιμές σε περίπτωση εφαρμογής σε νέες ποικιλίες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Μην αναμειγνύετε το GULLIVER με φυτοπροστατευτικά προϊόντα αλκαλικής αντίδρασης. Επιτρέπεται να το χρησιμοποιείτε σε μείγμα με τα ζιζανιοκτόνα (AURA 20 EC, BASAGRAN 48SL, CLINCHER Neo 200 EC, VIPER MAX). Σε περίπτωση ανάμιξης στο βυτίο, ακολουθήστε τους αυστηρότερους περιορισμούς, προφυλάξεις και διαστήματα αναμονής και να προηγηθεί δοκιμή μικρής κλίμακας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ :

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό. Να μην προκληθεί εμετός χωρίς ιατρική συμβουλή. Καλέστε αμέσως γιατρό. Να μην χορηγηθεί τίποτε σε αναισθητο άτομο.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Ξεπλύνετε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας, ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό.

Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τρυπήστε ή κάψτε τα καθαρά κενά υλικά συσκευασίας ή απομακρύνετε τα με άλλο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, αν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία χωρίς να ανοιχθεί, υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Ημ/νία Παρασκευής / Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε συσκευασία

