

The FMC logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The letters 'F', 'M', and 'C' are connected, with the 'F' having a distinctive shape where the top bar is slightly offset.

PROTECT FOR BETTER GROWTH

*Γρήγορη διείδυση
έντονη μινητιμότητα
+ πολυπλευρη δράση
= Υγιή Προστασία*

Impact[®] 125 SC

Μυκητοκτόνο

Το Impact[®] είναι μυκητοκτόνο με τριπλή δράση (διασυστηματική, διελασματική και με ατμούς) για την πρόληψη, θεραπεία και εξόντωση του φουζικλαδίου και ωιδίου σε μηλιά και αχλαδιά, καθώς και του ωιδίου στην ροδακινιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Impact[®] 125 SC

Μυκητοκτόνο

1

Διείσδυση

- Γρήγορη απορρόφηση
- Αντοχή στην έκπλυση
- Άμεση προστασία

2

Κίνηση στο φυτό

- Φτάνει πολύ γρήγορα στα προσβεβλημένα σημεία ακόμα και στην κάτω πλευρά των φύλλων (διελασματική δράση)
- Προστατεύει τα φύλλα καθώς εκτυύσσονται
- Αποτελεσματικό πριν και κατά την εξέλιξη της προσβολής

3

Δράση ατμών

- Απορρόφηση του προϊόντος και από άλλα σημεία πλην της σταγόνας ψεκασμού
- Ολοκληρωμένη διείσδυση

Δραστική ουσία	Flutriafol 12,5% β/ο
Χημική Ομάδα	Triazoles
Σκεύασμα	125 g/l Flutriafol (SC)
Τρόπος δράσης	παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14

Καλλιέργειες	Στόχοι	Δόση εφαρμ. (κ.εκ/στρέμμα) max	Δόση εφαρμ. (κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού)	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμ.)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	PHI*
Ροδακινιά	Ωίδιο	25	15 - 25	80 - 150	Ψεκασμοί από το τέλος της άνθησης και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.	7
Μηλιά Αχλαδιά	Φουζικλάδιο Ωίδιο	25	15 - 25	80 - 150	Ψεκασμοί από την πτώση των πετάλων και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.	21

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Ροδακινιά, Μηλιά, Αχλαδιά, 2

*PHI = Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
2. Μην ψεκάσετε όταν τα φυτά είναι σε στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, τροφοπενίες κλπ).
3. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα πάνω από 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

Είναι επίσης εγκεκριμένο για την καταπολέμηση του ωιδίου σε τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα (υπαίθρου & θερμοκηπίου), φράουλα (υπαίθρου) και οиноποιήσιμο αμπέλι, καθώς και των ωιδίου, σκωρίωσης, σεπτορίωσης, ελμινθοσπορίωσης και ρυνχοσπορίωσης σε σιτάρι και κριθάρι.