

The FMC logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The letters 'F', 'M', and 'C' are connected, with the 'F' and 'M' sharing a vertical stroke. The background of the entire advertisement is a close-up photograph of various vegetables, including red and yellow bell peppers and dark purple eggplants, which are slightly out of focus to emphasize the text and logo.

PROTECT FOR BETTER GROWTH

*Γρήγορη διείδδυση
έντονη μινητιμότητα
+ πολήπλευρη δράση
= Υγιή Πρόστασία*

Impact[®] 125 SC

Μυκητοκτόνο

Το Impact[®] είναι μυκητοκτόνο με τριπλή δράση (διασυστηματική, διελασματική και με ατμούς) για την πρόληψη, θεραπεία και εξόντωση του ωιδίου σε τομάτα μελιτζάνα, πιπεριά (υπαίθρου & θερμοκηπίου), φράουλα (υπαίθρου) και αμπέλι (οινοποιήσιμο), καθώς και των ωιδίου, σκωρί-ασης, σεπτόριας, ελμινθοσπορίωσης, ρυνχοσπορίωσης σε σιτάρι και κριθάρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Impact[®] 125 SC

Μυκητοκτόνο

1

Διείσδυση

- Γρήγορη απορρόφηση
- Αντοχή στην έκπλυση
- Άμεση προστασία

2

Κίνηση στο φυτό

- Φτάνει πολύ γρήγορα στα προσβεβλημένα σημεία ακόμα και στην κάτω πλευρά των φύλλων (διελασματική δράση)
- Προστατεύει τα φύλλα καθώς εκπύσσονται
- Αποτελεσματικό πριν και κατά την εξέλιξη της προσβολής

3

Δράση ατμών

- Απορρόφηση του προϊόντος και από άλλα σημεία πλην της σταγόνας ψεκασμού
- Ολοκληρωμένη διείσδυση

Δραστική ουσία	Flutriafol 12,5% β/ο
Χημική Ομάδα	Triazoles
Σκεύασμα	125 g/l Flutriafol (SC)
Τρόπος δράσης	παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14

Καλλιέργειες	Στόχοι	Δόση εφαρμ. (κ.εκ/στρέμ.) max	Δόση εφαρμ. (κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού)	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμ.)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	RHI*
Τομάτα Μελιτζάνα, Πιπεριά (υπαίθ. & θερμ.)	Οίδιο	75	75	100	Ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο της καρπόδεσης και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.	3
Φράουλα (υπαίθρου)	Οίδιο	50	50 - 75	60 - 100	Ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο της καρπόδεσης και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.	3
Αμπέλι (οινοπ.)	Οίδιο	50	50 - 75	40 - 100	Ψεκασμοί από το στάδιο της άνθησης	21
Σιτάρι, Κριθάρι	Οίδιο, Σκωρίαση, Σεπτόρια, Ελ- μινθοσπορίωση, Ρυγχόσπορίωση	100	-	15 - 30	Ψεκασμοί μέχρι την αρχή άνθησης	**

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά 2 / Φράουλα 2 / Αμπέλι 1 / Σιτάρι, Κριθάρι 1

*RHI = Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, ** Μη εφαρμοσίμο (μέχρι αρχή της άνθησης)

Παρατηρήσεις: 1. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
2. Μην ψεκάζετε όταν τα φυτά είναι σε στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, τροφοπενίες κλπ).
3. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα πάνω από 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

Είναι επίσης εγκεκριμένο για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου και ωιδίου σε μηλιά και αχλαδιά, καθώς και του ωιδίου στην ροδακινιά.