

FMC



SEAMAXX®

ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΔΙΑΛΥΤΟ ΥΓΡΟ

Βάση Υ.Α. 217217/2004

Συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης, καθιστά περισσότερο διαθέσιμα τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και προσδίδει ανοχή στο αβιοτικό στρες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- Το **SEAMAXX** είναι ένας ολοκληρωμένος βιοδιεγέρτης, με φυσικές βιοδραστικές ουσίες.
- Το **SEAMAXX** προστατεύει από αβιοτικό στρες.
- Το **SEAMAXX** προωθεί την αρίστη φυτική ανάπτυξη (βελτίωση της άνθησης, καρπώσεως, του μεγέθους και της ποιότητας των καρπών).
- Το **SEAMAXX** βοηθά στην βέλτιστη ανάπτυξη των καλλιεργειών, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εμπορεύσιμη παραγωγή.

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον CLP (REG EC 1272/2008). Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολιν-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Περιεχόμενο:

1 λίτρο

(Σε χαρτοκιβώτια 12X1 λίτρο)

Αρ.παρτίδας/Ημερ.παραγωγής:
Αναγράφεται επί της συσκευασίας
Παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
από τη **FMC AGRO LIMITED**, Rectors Lane,
Pentre, Flintshire, CH5 2DH, Ηνωμένο Βασίλειο.

Διανομή:
CHEMINOVA Agro A/S Greek Branch
Λ. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα
ΤΗΛ.: 211 198 3903- ΦΑΞ.: 211 113 8614
Εταιρεία του ομίλου: FMC Corporation

15140107/09012020 GREECE

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: **Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα:** 250 - 350 κ.εκ/στρέμμα 15-20 ημέρες μετά την μεταφύτευση - και επανάληψη ανά 14-20 ημέρες. **Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό, μαρούλι, σπανάκι, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, αγκινάρα, φασολάκια:** 250 - 350 κ.εκ/στρέμμα 15-20 ημέρες μετά την μεταφύτευση και επανάληψη ανά 14-20 ημέρες. **Πατάτα:** 200 - 300 κ.εκ/στρέμμα 2 εφαρμογές κατά την έναρξη δημιουργίας κονδύλων και διόγκωση του κονδύλου. Μια 3^η εφαρμογή μπορεί να είναι χρήσιμη κατά το τέλος της διόγκωσης των κονδύλων. **Καρότο:** 200 - 250 κ.εκ/στρέμμα 2 εφαρμογές κατά την έναρξη δημιουργίας του καρότου και διόγκωση του καρότου. Μια 3^η εφαρμογή μπορεί να είναι χρήσιμη κατά το τέλος της διόγκωσης των καρότων. **Κρεμμύδι, σκόρδο, βολβοί:** 200 - 300 κ.εκ/στρέμμα κατά την δημιουργία και διόγκωση του κονδύλου. 2-3 εφαρμογές. **Αμπέλι:** 200 - 300 κ.εκ/στρέμμα στην αρχή της βλαστικής περιόδου και επανάληψη ανά 15-20 ημέρες στην καρπώδη. **Φράουλα, μούρα:** 250 - 300 κ.εκ/στρέμμα 15-20 ημέρες μετά την μεταφύτευση και επανάληψη ανά 14-20 ημέρες. **Δενδροκομία, Συκιά, ακτινίδιο:** 250 - 350 κ.εκ/στρέμμα στην καρπώδη και επανάληψη ανά 14-18 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Ελιά:** 200 - 300 κ.εκ/στρέμμα στην καρπώδη και επανάληψη ανά 14-18 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Βαμβάκι:** 125-200 κ.εκ/στρέμμα από το 4ο φύλλο και επανάληψη ανά 25-30 ημέρες. **Σιτηρά:** 100-150 κ.εκ/στρέμμα 20 ημέρες από το 4ο φύλλο και επανάληψη ανά 25-30 ημέρες. **Αραβόσιτος, ζαχαρότευλα:** 150-200 κ.εκ/στρέμμα αρχίζοντας από το στάδιο 4 με 8 φύλλων και επανάληψη ανά 21-38 ημέρες. **Ελαιούχοι σπόροι:** 150-200 κ.εκ/στρέμμα 20 ημέρες μετά την βλάστηση και επανάληψη ανά 25-30 ημέρες. **Ψυχανθή (φασόλια, ρεβύθια, φακές αρακάς):** 100-150 κ.εκ/στρέμμα κατά την βλαστική περίοδο και επανάληψη μετά την ανθοφορία. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν σε πολύ έντονο ηλιακό φως ή σε ακραίες θερμοκρασίες. Εάν είναι δυνατόν, ψεκάστε το βράδυ ή νωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα. Οι προτεινόμενες δόσεις μπορεί να ποικίλουν λόγω διαφορετικών τύπων εδάφους, διαφορετικών γεωργικών πρακτικών και καιρικών συνθηκών. Να συμβουλευέστε πάντα έναν τεχνικό. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ανακινήστε καλά το δοχείο

πριν το ανοίξετε και το χρησιμοποιήσετε. Ο εξοπλισμός ψεκασμού πρέπει να είναι καθαρός. Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού με νερό μέχρι τη μέση, αρχίστε την ανάδευση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του **SEAMAXX**. Ξεπλύνετε προσεκτικά το δοχείο, προσθέστε τα ξεπλύματα στη δεξαμενή ψεκασμού, συμπληρώστε το γέμισμα και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Χρησιμοποιείτε αρκετό νερό για καλή ψεκαστική κάλυψη. Ο ψεκασμός φυλλώματος θα πρέπει να εφαρμοστεί ως λεπτή ομίχλη μέχρι διαβροχής. Μην ψεκάζετε ακριβώς πριν ή μετά τη βροχόπτωση ή την άρδευση με καταιωνιστήρες. Διατηρήστε ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια ψεκασμού. Φοράτε προστατευτική μάσκα σε όλη τη διάρκεια. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι φυσικά και χημικά συμβατό με ένα ευρύ φάσμα αγροχημικών προϊόντων. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για τις τελευταίες πληροφορίες. Να διαβάσετε πάντοτε την ετικέτα του προϊόντος προσεκτικά πριν την ανάμειξη με το **SEAMAXX**. Δεν συνδυάζεται με θειικό μαγνήσιο, ορυκτέλαια και ελαιούχα ενισχυτικά - συνεργιστικά ψεκασμών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία και σε χώρο στεγνό, δροσερό μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Προστατέψτε από τον παγετό. Φυλάσσεται πάνω από τους 5°C.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Επαφή με τα μάτια: Κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά.

Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό.

Εισπνοή: Απομακρύνετε το άτομο από την έκθεση εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του ατόμου ενώ το κάνετε.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως αν παρουσιαστούν συμπτώματα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777