

# Cottonex<sup>®</sup> 50sc

Fluometuron (Φθουομετουρόν) 50%  
Συμπυκνωμένο εναιώρημα

**Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων  
πλάτυφυλλων & αγρωστωδών ζιζανίων στο βαμβάκι και το σουσάμι.**

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**

Fluometuron .....50% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες .....55,1% β/β

A.A.Δ.A.: 70130/18.09.2015

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθμός Παρτίδας:

Ημερομηνία παραγωγής:

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ**



Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας





### ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
Υποπνο για πρόκληση καρκίνου.  
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

### ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αποφύγετε να αναπνεύσετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων / εκνεφρώματα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέρσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

Φοράτε μπότες κατά την εφαρμογή.

Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, φόρμα και μπότες εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής ήλιο μετά τον ψεκασμό.



### Όχιγες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέρσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριηφά εξέλκυση (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπωμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφεται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



Μην ρυπαίνετε το νερό με το οξείμασ ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατεύσετε τα φυτά μη στόχους να αφαιρέσει μίαν αφέκαστη ζώνη 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Για να αποφυγείτε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

### Πρώτες Βοήθειες - Αντιόδο:

**Σε περίπτωση κατάποσης,** καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδύνατο. Ξεπλύνετε το στόμα.

**Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης,** συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήσει ερεθισμό, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρήσει ερεθισμό, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση εισπνοής,** μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα.

**Αντιόδο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

**ΚΟΤΩΝΕΣ 50sc:** Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων ηλιόφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στο βαμβάκι και το σουσάμι. Δεν διασυστηματικό. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα. Παρεμβολίζει την φωτοσύνθεση.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους προσαρμοστικό με ενσωμάτωση ή προληπτικό, αμέσως μετά τη σπορά. Η εφαρμογή να γίνεται με μικρό τύλιμο σκεύος, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm (45 psi) και με σταθερή ταχύτητα 4 περίπου χιλιόμετρα ανά ώρα, υπό συνθήκη άνευδου.

### ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟ:

Ανασάτε καλά τη φάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα οξείμαστος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε στο ψεκαστικό δοχείο αναμειγμένο. Σημειώνεται να το αναμειγμένο νερό υποστεί ανάδευση.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρυνθεί όλη τα ίχνη του οξείμαστος. Ξεπλύνετε το βύτιο και όλη τα εξαρτήματα του ψεκαστικού δύο-τρεις (2-5) φορές με καθαρό νερό.

### ΚΑΛΗΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΙΧΑ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

**BAMBAC:** Καταπολέμηση ετήσιων ηλιόφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Εφαρμογές: **α)** Προσπορική με ενσωμάτωση. Δόση: 200-400 κ.ε./στρέμμο. **β)** Προληπτική αμέσως μετά τη σπορά. Δόση: 200-400 κ.ε./στρέμμο. **γ)** Επώθη εφαρμογή. Προσπορική με ενσωμάτωση-Προσπορική. Δόση: 300+100 κ.ε./στρέμμο. **ΣΟΥΣΑΜΙ:** Καταπολέμηση ετήσιων ηλιόφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Δόση: 200-400 κ.ε./στρέμμο. Εφαρμογή προληπτική αμέσως μετά τη σπορά.

Υψος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα/στρέμμο.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργεια/επίοδο: **Μεσοδύση:** εφαρμογών: Βαμβάκι (α) και (β)-Σουσάμι: Μία (1) εφαρμογή. Βαμβάκι (γ): Δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

### Παρατηρήσεις:

- 1) Η δόση είναι ανάλογη με τον τύπο εδάφους. Ο μειωμένος δόσεις στα βαριά εδάφη και οι μικρότερες στα ελαφριά εδάφη. 2) Η προσπορική εφαρμογή με ενσωμάτωση συνιστάται για έτη εδάφη ή όταν αναμένεται με επικρατούντες συνθήκες βροχής μετά την εφαρμογή. 3) Σε 7-10 μέρες από την προσπορική εφαρμογή του, να ακολουθήσει βροχή ή όρεση, με 20-30 κ.ε. νερό, ώστε να ενεργοποιηθεί η φλογιστική. 4) Μην το χρησιμοποιείτε σε ομίχλη εδάφη. 5) Καταπολέμηση ζιζανίων για τη μεγάλη δόση. **α)** και **β)** εφαρμογές και για Σουσάμι: **ii)** Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια: Μουριάκι. **iii)** Ευαίσθητα ηλιόφυλλα ζιζάνια: Βίλητα, Αγρωστώδη\*, Κοιλιόβιο\*, Τσίπουρα, Χαμυρήλη, Ηλιόφραση\*, Αρακάρισμα, Πιπινάκι, Ανταρσία, Μαρσάκος, Αγριο άνθος, Αγρωστώδη, Ζακί, Αγρωστώδη\*, Τριφύλλι. \*Καταπολέμηση καλλιέργειες με τη μεγάλη δόση. **iii)** Μεγάλη ευαίσθητα ζιζάνια: Χλωροδρόμο, Διαδοκίνο, Στάριες. 6) Για την καταπολέμηση και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων, το **Cottonex® 50Sc** μπορεί να συνδυαστεί με **Pendimethalin® 33EC**, **Acifluorfen® 33EC** ή **οξείμαστος ζιζανίων για (γ) εφαρμογή σε Βαμβάκι**: Μουριάκι, Σίλητα, Λαυράκι, Διός, Τσίπουρα, Αγρωστώδη, Αγρωστώδη. 7) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητά και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του σουσάμι από τη χρήση του οξείμαστος. Για την χρήση του οξείμαστος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της δόσης δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απώλειες που αφορούν την αποτελεσματικότητά ή τη φυτοτοξικότητά από τη χρήση του οξείμαστος ή χρήση του οξείμαστος, στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

### ΤΕΛΕΥΤΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΜΗ:

Βαμβάκι-Σουσάμι: Δεν εφαρμόζεται, καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του οξείμαστος.

### ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΚΙΜΟΤΗΤΑΤΗΣ:

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανεκτικότητας, υποβάθεται εναλλακτικά πρακτικές αντιμετώπισης των ζιζανίων (μηχανική, καλλιέργεια), όπου είναι εφικτό, ή γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΤΕΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:** Σε περίπτωση σποράς της καλλιέργειας, στην οποία χρησιμοποιήθηκε το οξείμαστο, στην ίδια σπορά, την ίδια περίοδο, μπορεί να σπαρά μόνον Βαμβάκι.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:** Μην σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 6 μήνες από την εφαρμογή του και μετά από βαθύ όρυγμα.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΣΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΟΡΘΙΑ ΕΚΔΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟ ΕΓΧΕΥΜΑ:** Όταν έχει στεγνώσει το οξείμαστο.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Είναι εκλεκτικό στο βαμβάκι και δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Συνδυάζεται με το ζιζανιοκτόνο **Pendimethalin® 33EC**, **Acifluorfen® 33EC** και **Orient® 33EC**.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΥΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΛΗΞΗΣ ΚΑΙ Η ΜΗΡΜΗΝΙΑ ΑΓΗΣ:** Διατηρείται στην αρχική του απορροφήσιμη συσκευασία, σε χώρο άρροσης, ήλιο και καλό αερισμένο, μακριά από πηλό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

### ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

# Cottonex® 50Sc

# ΠΕΡΙΕΧΟΙΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ

