

FMC

Affinity[®] 6 ME

Carfentrazone-ethyl 6%
(Καρφεντραζόν-εθύλ)

(ME) Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης

Ζιζανιοκτόνο-αποξηραντικό για την αποξήρανση του υπέργειου μέρους της πατάτας πριν τη συγκομιδή.

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
Δραστική ουσία: Carfentrazone-ethyl: 6% (β/ο),
Βοηθητικές ουσίες 92,92 % (β/β)

**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες
Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά**

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
(ΑΑΔΑ): 8295/15-05-2021, λήξη 11-09-2021**
(κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης)

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
βλέπε συσκευασία

Περιεχόμενο: **1 Λίτρο**

Κάτοχος της άδειας:
ΑΣ Σαγείκων Αχαΐας, Π.Ε.Ο Πάτρας-Πύργου,
25200-Σαγείκα Αχαΐας, sageika@otenet.gr
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά: FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα,
Τηλ.: 211 198 3903, Fax: 211 113 8614,
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Ζιζανιοκτόνο-αποξηραντικό για την αποξήρανση του υπέργειου μέρους της πατάτας πριν τη συγκομιδή. Η δραστική ουσία του σκευάσματος (carfentrazone-ethyl) παρεμποδίζει το ένζυμο οξειδάση του πρωτοπορφυρογόνου (Protoporphyrinogen - oxidase, PPG - O ή PP - O), ενός βασικού ενζύμου για την βιοσύνθεση της πρωτοπορφυρίνης (protoporphyrin).

Φάσμα δράσης: Για την αποξήρανση του υπέργειου μέρους της πατάτας πριν τη συγκομιδή με δόση 100 κ.εκ/στρέμμα και όγκο ψεκαστού υγρού 30-60 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός κάλυψης. Εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή καθώς και επαρκή διείσδυση του προϊόντος στη βλάστηση. Εφαρμόστε το προϊόν κατά την πλήρη ωρίμανση των κονδύλων και στην αρχή της διαδικασίας γήρανσης της καλλιέργειας.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα: 1 εφαρμογή. Σε σπάνιες περιπτώσεις 2 εφαρμογές ανά 5-7 ημέρες

Παρατηρήσεις: 1. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί 2ος ψεκασμός. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείτε την ίδια δόση, 5-7 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή. 2. Εάν η εφαρμογή πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της περιόδου γήρανσης ή με την παρουσία μιας ιδιαίτερα σημαντικής φυτικής μάζας, λίγες ημέρες πριν την εφαρμογή να γίνει μηχανική σύνθλιψη της βλάστησης (στελέχη μήκους 10-15 κ.εκ.). 3. Εάν έχει πραγματοποιηθεί μηχανική σύνθλιψη της βλάστησης (στελέχη μήκους 10-15 κ.εκ.), εφαρμόστε δόση 100 κ.εκ/στρέμμα, 2-4 ημέρες μετά τη μηχανική επέμβαση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός κάλυψης. Εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή καθώς και επαρκή διείσδυση του προϊόντος στη βλάστηση. Χρησιμοποιήστε μπέκ τύπου καθρέπτη.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με καθαρό νερό, θέτοντας σε λειτουργία την αναδευτήρα. Προσθέστε σταδιακά το προϊόν στο δοχείο. Γεμίστε πλήρως το δοχείο συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Μην προ-αναμειγνύετε το **AFFINITY** σε λίγο νερό πριν το προσθέσετε στο δοχείο του ψεκαστικού. Συνιστάται η συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Τριπλό ξέπλυμα με νερό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται τρεις φορές (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Συνδυαστικότητα: ---.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Εφαρμόστε το προϊόν κατά προτίμηση το πρωί, ακόμη και σε ελαφρά υγρή βλάστηση. Διαδικασία αποξήρανσης στελεχών της πατάτας: για να επιτευχθεί η βέλτιστη δραστηριότητα της αποξήρανσης, να μην εφαρμόζεται το προϊόν σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες: υπερβολική ξηρασία ή υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες, πολύ χαμηλή υγρασία αέρα. Να μην εφαρμόζεται το προϊόν κατά τη νύχτα. Το **Affinity** να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες πατάτας που έχουν προσβληθεί από σοβαρές επιθέσεις παθογόνων. Αποφύγετε την διασπορά σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος σε όμορες καλλιέργειες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα: Επιτρέπεται η πρόσβαση του ανθρώπου αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πατάτα 3 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες (>35°C) και το άμεσο ηλιακό φως.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων / σπμους / εκνεφώματα.
- Να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.
- ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
- Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
- Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: Συμβουλευτείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης:** Κρατήστε τον παθόντα σε πρέμια. Μην προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε σύμπτωμα. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Πλύνετε καλά το δέρμα με νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση τυχαίας εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε σύμπτωμα. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΑΤΡΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Συνιστάται η αποφυγή έκθεσης στο προϊόν, συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777