



UFI: PJU8-X388-SN4R-F4GR



ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο νευρικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει Cyclohexanol και 2,6-di-tert-butyl-p-methylphenol / BHT. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Δηλώσεις Προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Πλυθείτε σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. «Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μάσκα, γυαλιά και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση. Κατά την εφαρμογή φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό, φοράτε μπότες, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι». Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν οι παρακείμενες καλλιέργειες είναι σε ανθοφορία. Για την προστασία των μελισσών θα πρέπει οι μελισσοκόμοι της περιοχής να ενημερωθούν ώστε τα μελίσσια να απομακρυνθούν από την περιοχή για τουλάχιστον: -96 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες θερμοκηπίου, για εξαπόλυση βομβινών/μελισσών στα θερμοκήπια.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης δίνονται στο εσωτερικό της ετικέτας

11014298_11038_GREECE



11014298_11038_LBL_ML-B_5L_ASTERIA ULTRA 1.8EC_GR_2_BOOKLET_3PAGES

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11014298	Base for Booklet	
Product SKU Description	5L_ASTERIA ULTRA 1.8EC_GR_2_BOOKLET_3PAGES	Booklet	105X140
Label SKU	11038	Number of pages (Booklet)	3
Label SKU Description	LBL_ML-B_5L_ASTERIA ULTRA 1.8EC_GR_2_BOOKLET_3PAGES	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Καλλιέργειες – στόχοι – δόσεις - χρόνος & τρόπος εφαρμογής):

Φράουλα (Θ): Εναντίον του Τετράνυχου (*Tetranychus urticae*) και της Λιριόμυζα (*Liriomyza sp.*) με δόση 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (120 max κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα: 50-120. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/14.

Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ): Εναντίον του Τετράνυχου (*Tetranychus urticae*) και της Λιριόμυζα (*Liriomyza sp.*) με δόση 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (120 max κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα: 60-150. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/20.

Πιπεριά (Θ): Εναντίον του Τετράνυχου (*Tetranychus urticae*) με δόση 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (75 max κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα: 60-150. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/20.

Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ): Εναντίον του Τετράνυχου (*Tetranychus urticae*) και της Λιριόμυζα (*Liriomyza sp.*) με δόση 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (120 max κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα: 60-150. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/20.

Μαρούλι (Θ): Εναντίον του Τετράνυχου (*Tetranychus urticae*) και της Λιριόμυζα (*Liriomyza sp.*) με δόση 50-56 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (28 max κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα: 50-55. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/14.

Καλλωπιστικά (Θ): Εναντίον του Τετράνυχου (*Tetranychus urticae*) και της Λιριόμυζα (*Liriomyza sp.*) με δόση 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (120 max κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα: 50-250. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1.

Παρατηρήσεις: Η δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού θα πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη συνιστώμενη δόση ανά στρέμμα.

Οδηγίες Χρήσης:

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και όπου συνιστάται λαδιού ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης,

να εναποθεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από αστία.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο - Φεβρουάριο).

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία abamectin, ένα εντομοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 6 κατά IRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται να γίνεται εναλλαγή με άλλα εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα πριν να έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό και συγκεκριμένα πριν περάσουν: - 13 ημέρες, σε Μαρούλι, - 3 ημέρες, στα υπόλοιπα λαχανικά, - 11 ημέρες, σε Καλλωπιστικά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Μαρούλι (Θ): 21 ημέρες, Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ): 7 ημέρες, Φράουλα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ): 3 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία. Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την ετικέτα ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκούραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Πλύνετε το στόμα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροϊκού οξέος.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 - 7793777