



Έργα τέχνης



Τοποθέτηση προϊόντων θρέψης και βιοδιεγερτών σε καρπούζι & πεπόνι

Αντώνης Μαρκάκης

**FMC**

An Agricultural
Sciences Company

Έκδοση Φεβρουάριος 2021


Μεταφύτευση: Η χρονική περίοδος που αναφέρεται ενδεικτικά ,αφορά φυτεύσεις κυρίως κάτω από θερμοκήπια και χαμηλά τούνελ (καλύψεις) στην Ν. Ελλάδα. Οι προτάσεις είναι παρόμοιες και για πιο όψιμες φυτεύσεις. Το πεπόνι είναι περισσότερο ανθεκτικό και έχει κάπως λιγότερες απαιτήσεις στην καλλιέργειά του. Εδώ η αναφορά γίνεται σε απαιτητική καλλιέργεια καρπουζιού-πεπονιού

Στόχος Χρονική περίοδος ανάλογα με την περιοχή: Ιανουάριος - Μάρτιος

- ❖ Καλή εγκατάσταση, πλούσια ριζοβολία και αποφυγή μεταφυτευτικού σοκ.
- ❖ Προστιθέμενη αξία σε όλη την καλλιεργητική περίοδο λόγω του Accudo®

Πρόταση

❖ Accudo®	50 ml	/στρ.
+		
❖ Hi-Phos®	200-300 ml	/στρ.
	(ανάλογα με την βασική λίπανση)	
+		
❖ Seamac® Pro	200-250 ml	/στρ.



12

Accudo® : Συνίσταται η πρώτη εφαρμογή να γίνεται στους δίσκους με δόση 50ml/1000 φυτά. Με μια πυκνότητα φύτευσης 220-250 φυτά/στρ., η δόση θα είναι 11-12,5 ml/στρ. Επιτυγχάνεται καλύτερη οικονομικότητα και εγκατάσταση του βακτηρίου στο ριζικό σύστημα

Στάδιο εφαρμογής (BBCH 11 - 14)

Στόχος

- ❖ Γρήγορη ανάπτυξη
- ❖ Πρωιμότητα
- ❖ Πλούσιο ριζικό σύστημα
- ❖ Αυξημένη ευρωστία
- ❖ Αντοχή σε καταπονήσεις από αβιοτικό στρες.

Χρονική περίοδος ανάλογα με την περιοχή: Ιανουάριος – Απρίλιος

Πρόταση

❖ Accudo®	35-50 ml	/στρ.
+		
❖ Hi-Phos®	200-300 ml	/στρ.
	(ανάλογα με την βασική λίπανση)	
+		
❖ Seamac® Pro	200-250 ml	/στρ.




15

Στάδιο εφαρμογής (BBCH 15 - 20)

Στόχος

- ❖ Γρήγορη προσέγγιση της γόνιμης ανθοφορίας
- ❖ Πρωιμότητα



Πρόταση

❖ **Seamac® Pro** **200-250 ml** **/στρ.**

23

Στάδιο εφαρμογής (BBCH 21 - 29)

Χρονική περίοδος: Λίγο πριν το ξεσκέπασμα-Αρχή της γόνιμης ανθοφορίας

Στόχος

- ❖ Πρωιμότητα
- ❖ Υποβοήθηση της άνθησης
- ❖ Αντιμετώπιση αβιοτικού στρες (κρύος καιρός κατά το ξεσκέπασμα)

Πρόταση

❖ Hi-Phos®	250-300 ml	/στρ.
+		
❖ Bo La®	500 ml	/στρ.
+		
❖ Seamaxx®	200-250 ml	/στρ.



51

Στάδιο εφαρμογής (BBCH 31 - 51)

Στο στάδιο αυτό η καλλιέργεια ξεσκεπάζεται. Μέχρι εδώ, οι εφαρμογές γίνονται μόνο με στάγδην άρδευση. Μετέπειτα μπορεί να γίνουν και διαφυλλικά

Από καρπόδεση μέχρι την απόκτηση του τελικού μεγέθους (εφαρμογές με στάγδην ή διαφυλλικά)

Στόχος

- ❖ Γρηγορότερη απόκτηση τελικού μεγέθους
- ❖ Αύξηση μεγέθους καρπών
- ❖ Καλύτερο γέμισμα των καρπών
- ❖ Αύξηση της ποιότητας και ανθεκτικότητας σε χειρισμούς


Πρόταση

- ❖ **Vercal®** 300-500 ml/100 L νερό (διαφυλλικά)
ή 1 L/στρ. (στάγδην άρδευση)
- +
- ❖ **Seamac® Pro** 250 ml/100 L νερό (διαφυλλικά)
ή 250 ml/στρ. (στάγδην άρδευση)

2-3 εφαρμογές με
μεσοδιαστήματα 10 ημερών



65



81


Στάδιο εφαρμογής (BBCH 65 - 81)

Στόχος

❖ Αντιμετώπιση αβιοτικού στρες

Πρόταση



❖ Seamaxx® 250 ml/100 L νερό (διαφυλλικά)
ή 250 ml/στρ. (στάγδην άρδευση)
+
❖ Bo La® 500 ml/στρ. (στάγδην άρδευση)



89

Στάδιο εφαρμογής (BBCH 89)

Θρέψη





Όριμα και ζουμερά