



SEAMAC® OR

ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Βάση Υ.Α. 217217/2004

ΔΙΑΛΥΤΟ ΥΓΡΟ

Το Seamac® OR είναι ένα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συμπυκνωμένο εκχύλισμα φυκιών που προέρχεται από καλλιεργημένα κόκκινα μακροφύκη του είδους *Kappaphycus alvarezii*.

Το Seamac® OR είναι ένα ισορροπημένο σκεύασμα που συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης του φυτού κάτω από κανονικές αλλά και κάτω από συνθήκες καταπόνησης.

Οι περιεχόμενοι ολιγοσακχαρίτες, που προέρχονται από την εκχύλιση του συγκεκριμένου είδους φυκιού, επιδρούν στις φυσιολογικές διεργασίες του φυτού με αποτέλεσμα:

- να αυξάνεται η φωτοσυνθετική δραστηριότητα του φυτού,
- να καθίστανται περισσότερο διαθέσιμα τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους,
- να αυξάνεται η ποιότητα των παραγόμενων καρπών,
- να αυξάνεται η ανθεκτικότητα των φυτών σε συνθήκες καταπόνησης και
- να βελτιώνεται η παραγωγή.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Εκχύλισμα φυκιών του είδους *Kappaphycus alvarezii*: 11% β/β

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Υπεύθυνος Διάθεσης:
FMC Χημικά Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε
Λ. Συγγρού 348, Καλλιθέα,
Τ.Κ: 17674, Τηλ.: 211 198 3903

11014847_10692_GREECE

Τα FMC, FMC logo και
SEAMAC® είναι
εμπορικά σήματα της
FMC Corporation ή και
θυγατρικών της.
©2022 FMC Corporation.
All rights reserved.

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Διαφυλλικές εφαρμογές:

Δενδρώδεις καλλιέργειες: Δόση 100 κ.εκ./στρ. Προτεινόμενος αριθμός εφαρμογών 2-4 ανά καλλιεργητική περίοδο. Συνιστώνται 2 εφαρμογές φορές πριν την άνθηση και 2 εφαρμογές μετά την ανθοφορία με μεσοδιάστημα 30 ημερών.

Λαχανικά: Δόση 100 κ.εκ./στρ. Συνιστάται μια πρώτη εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση για την αποφυγή του μεταφυτρωτικού σοκ και την ισχυρότερη ανάπτυξη ριζικού συστήματος. Οι εφαρμογές συνεχίζονται κατά την περίοδο βλάστησης και στα στάδια της αρχής της ανθοφορίας, της καρπόδεσης και της ανάπτυξης του καρπού. Προτεινόμενος αριθμός εφαρμογών 3-4 ανά καλλιεργητική περίοδο.

Εκτατικές καλλιέργειες (Αραβόσιτος, σιτηρά, βαμβάκι, μηδική, πατάτα κλπ): Δόση 100 κ.εκ./στρ. Για ισχυρό ριζικό σύστημα, αντιμετώπιση καταστάσεων καταπόνησης των φυτών και υγιή ανάπτυξη, συνιστώνται 2-3 εφαρμογές στα στάδια βλαστικής ανάπτυξης της καλλιέργειας, στην αρχή της άνθησης και στην καρπόδεση.

Εφαρμογές μέσω άρδευσης: Για όλες τις προαναφερόμενες καλλιέργειες, η δόση για εφαρμογή με στάγδην άρδευση είναι 200 κ.εκ./στρ. Συνιστάται το προϊόν να εφαρμόζεται στο μέσον της άρδευσης. Να ακολουθούνται τα στάδια εφαρμογής που αναφέρονται πιο πάνω καθώς και οι προτεινόμενοι αριθμοί εφαρμογών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: -Ανεξάρτητα από τα στάδια εφαρμογής που αναφέρονται παραπάνω, συνιστάται να εφαρμόζεται το προϊόν και σε κάθε περίπτωση πιθανής καταπόνησης για την καλύτερη

και ταχύτερη αντιμετώπιση του. -Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν σε πολύ έντονο ηλιακό φως ή σε ακραίες θερμοκρασίες. Εάν είναι δυνατόν, ψεκάστε το βράδυ ή νωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα. -Αποφύγετε τις εφαρμογές όταν αναμένεται βροχόπτωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείστε επαρκή όγκο νερού για την πλήρη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το Seamac® OR είναι φυσικά και χημικά συμβατό με ένα ευρύ φάσμα αγροχημικών προϊόντων. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Πάντα να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος πριν από την ανάμιξη με Seamac® OR.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Προστατεύστε το σκεύασμα από τον παγετό. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 5°C. Κρατήστε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο κατάλληλο μέρος. Μην το αποθηκεύετε σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε άμεσες πηγές φωτός και θερμότητας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Αρ.Παρτίδας/Ημερ. Παραγωγής:
Αναγράφεται επί της συσκευασίας

Προϊόν της Sea6 Energy Private Limited.

Περιεχόμενο: **1 Λίτρο**