

# Τοποθέτηση προϊόντων θρέψης και βιοδιεγερτών σε σιτηρά




## Στόχος

- ❖ Άμβλυση της καταπόνησης (κυρίως λόγω καιρικών συνθηκών)
- ❖ Προώθηση της ανάπτυξης

## Πρόταση

- ❖ **Multiple™ Pro**      100 cc/στρ.
- +
- ❖ **Seamac® Power**      40-50 gr/στρ
- ή
- ❖ **Seamaxx®**      200-250 ml/στρ.



10

21


Στάδιο εφαρμογής  
(BBCH 10 - 21)

## Στόχος

- ❖ Περισσότερα και πιο υγιή αδέλφια

### Πρόταση

- ❖ **Multiple™ Pro** 100 cc/στρ.
- +
- ❖ **Seamac® Power** 40-50 gr/στρ
- ή
- ❖ **Seamaxx®** 200-250 ml/στρ.
- ή (μετά από δοκιμή)
- ❖ **Seamac® Pro** 250 ml/στρ.



21

30

Στάδιο εφαρμογής  
(BBCH 21 - 30)

## Στόχος

- ❖ Άμβλυση προβλημάτων φυτοτοξικότητας από εφαρμογές ζιζανιοκτόνων
- ❖ Καλή ανάπτυξη των αδελφιών

## Πρόταση

**Multiple™ Pro**

**100 cc/στρ.**

**+**

❖ **Seamac® Power**

**40-50 gr/στρ**

**ή**


❖ **Seamaxx®**

**200-250 ml/στρ.**

**ή (μετά από δοκιμή)**

❖ **Seamac® Pro**

**250 ml/στρ.**



30

37


Στάδιο εφαρμογής  
(BBCH 30 - 37)

## Στόχος

- ❖ Διατήρηση της υγείας του φυτού
- ❖ Προετοιμασία του φυτού για είσοδο στο στάδιο της άνθησης

## Πρόταση

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Multiple™ Pro</b>       | <b>100 cc/στρ.</b>     |
| <b>+</b>                   |                        |
| ❖ <b>Seamac® Power</b>     | <b>40-50 gr/στρ</b>    |
| <b>ή</b>                   |                        |
| ❖ <b>Seamaxx®</b>          | <b>200-250 ml/στρ.</b> |
| <b>ή (μετά από δοκιμή)</b> |                        |
| ❖ <b>Seamac® Pro</b>       | <b>250 ml/στρ.</b>     |



## Στόχος

- ❖ Αύξηση βάρους και ποιότητας καρπών
- ❖ Αύξηση περιεκτικότητας πρωτεϊνών

## Πρόταση


**Multiple™ Pro**

**100 cc/στρ.**

+

❖ **Seamac® Pro**

**200-250 ml/στρ.**



71 - 79

Στάδιο εφαρμογής  
(BBCH 71 - 79)

## Θρέψη

