

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Καλλιέργειες - στόχοι - δόσεις - χρόνος & τρόπος εφαρμογής):**  
**ΕΠΕΡΙΔΟΞΙΔΗ** (Λευμόνι, Γκρέιφφρουτ, Μανταρινιά, Νεράντζι, Πορτοκαλιά): Εναντίον της Ψευδοσφάρας των καρπών (*Phytophthora* sp.) με δόση 267-400 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (400 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-150. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ένας ψεκασμός στην αρχή αλλαγής χρώματος των καρπών (BBCH 73). Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1. **ΤΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Ροδακινιά, Δαμασκινιά): Εναντίον του Εξώρσου (*Parthena oleatrans*) με δόση 267-400 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (400 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-150. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ένας ψεκασμός πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή μετά τη συγκομιδή (BBCH<55 ή >91). Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1. **ΑΚΡΟΔΑΥΑ (ΚΑΣΤΑΝΙΑ):** Εναντίον της Μυκοσφαίρελλας (*Mycosphaerella* sp.) με δόση 167-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (300 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 150-180. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ένας ψεκασμός πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή μετά τη συγκομιδή. Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1. **ΦΟΥΥΤΟΥΚΙΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ:** Εναντίον των Βακτηριώσεων (*Xanthomonas* sp.) με δόση 222-267 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (400 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 150-180. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ένας ψεκασμός πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή μετά τη συγκομιδή. Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1. **ΑΜΠΕΛΙ:** Εναντίον του Περονόπορου (*Plasopora viticola*) με δόση 238-396 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (238 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-100. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Τρεις (3) ψεκασμοί από την έκπτυξη του 3<sup>ου</sup> φύλλου έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 13-60). Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 3/7. Εναντιον της μούρης οήνης (*Gignardia bidwellii*) με δόση 278 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (278 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 5 ψεκασμοί από την έναρξη της άνθησης έως την έναρξη ωρίμανσης των ραγών (BBCH60-83). Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 3/7. **ΕΛΙΑ:** Εναντίον του Κυκλάδιου (*Sphaecia oleagria*) και για Χρόνης ήσσονος σημασίας: Γλοιοσπόριο (*Colletotrichum gloeosporioides*\*, *Colletotrichum acutatum*\*, *Colletotrichum daivatum*\*) με δόση 288 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (288 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ένας ψεκασμός πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή μετά τη συγκομιδή (BBCH<59 ή >89). Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1. **ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ:** Εναντίον της Βακτηρίωσης (*Pseudomonas syringae*var. *actinidiae*) με δόση 117-176 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (176 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-150. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Δύο ψεκασμοί μετά την άνθηση (BBCH70). Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/10 ή με δόση 240-360 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (360 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-150. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ένας ψεκασμός πριν την άνθηση ή μετά τη συγκομιδή (BBCH90). Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1. **ΣΟΛΑΝΩΔΗ** Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ): Εναντίον του Περονόπορου (*Phytophthora infestans*). Για καλλιέργειες υπαίθρου (Υ) με δόση 348-463 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (278 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-80. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πέντε (5) ψεκασμοί από την έκπτυξη του 5<sup>ου</sup> φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 15-89). Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 5/7. Για καλλιέργειες θερμοκηπίου (Θ) με δόση 185-463 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (278 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-150. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πέντε (5) ψεκασμοί από την έκπτυξη του 5<sup>ου</sup> φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 13->89). Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 5/7. **ΚΟΛΥΚΥΝΘΟΕΙΔΗ** Αγγούρι (Υ+Θ). Κολυκθύδακι (Υ+Θ): Εναντίον του Ψευδοπερονόπορου (*Pseudoperonospora cubensis*). Για καλλιέργειες υπαίθρου (Υ) με δόση 278-926 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (278 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-100. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πέντε (5) ψεκασμοί από την έκπτυξη του 3<sup>ου</sup> φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 13->89). Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 5/7. **ΠΕΠΟΝΙ (Υ):** Εναντίον του Ψευδοπερονόπορου (*Pseudoperonospora cubensis*) με δόση 278-926 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.

υγρού (278 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-100. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πέντε (5) ψεκασμοί από την έκπτυξη του 3<sup>ου</sup> φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 13->89). Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 5/7. **ΣΚΟΡΔΟ (Υ), ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Υ):** Εναντίον του Περονόπορου (*Peronospora destructor*) με δόση 335-450 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (270 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-80. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 4 ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων προβόλης, από το 5<sup>ο</sup> φύλλο έως την ωρίμανση των βολών (BBCH 14-47). Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 4/7. **ΠΑΤΑΤΑ:** Εναντίον της *Phytophthora infestans* με δόση 386-515 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (309 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-80. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 4/7. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:** Εναντίον του Περονόπορου (*Phytophthora* sp.), της Κερκόσπορας (*Cercospora* sp.), του Γλοιοσπόριου (*Gloeosporium* sp.), της Ξκαρίωσης (*Puccinia* sp.) και των Βακτηριώσεων (*Pseudomonas syringae*) με δόση 278-463 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (278 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-100. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πέντε (5) ψεκασμοί με την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 5/7. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ:** Εναντίον του Περονόπορου (*Phytophthora* sp.), της Κερκόσπορας (*Cercospora* sp.), του Γλοιοσπόριου (*Gloeosporium* sp.), της Ξκαρίωσης (*Puccinia* sp.) και των Βακτηριώσεων (*Pseudomonas syringae*) με δόση 552-920 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (552 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-100. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ένας ψεκασμός με την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1. **Παρατηρήσεις:** 1. Ενδέκεται η αποτελεσματικότητα κατά του *Xanthomonas* sp. στην καρδιά να είναι μειωμένη. 2. Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χολκώου σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό καλλίο). 3. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες επιτραπέζιου σταφυλιού Σουλτανίνα και Κορινθιακή σταφίδα, στις ποικιλίες της ελιάς Κοραντζίκη και Καλαμών, καθώς και στις καλλιέργειες καστανιάς, φουντουκιάς και καρυδιάς. \*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στο γλοιοσπόριο της ελιάς. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στο αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευασμάτος». **Οδηγίες Χρήσης: Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το ψεκαστικό με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνολωμένη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αμέσως μετά τη χρήση οδισάτε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενος με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Μυκητοκτόνο/Βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:** - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα - 6 ώρες μετά την εφαρμογή σε υπαίθριες καλλιέργειες και - 8 ώρες μετά την εφαρμογή σε θερμοκήπιο/κλειστάς χώρους. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κώδς άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις αντιστοιχόμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.Μπορεί να προκαλέσει κηλίδωση (spotting) στα επιτραπέζια σταφύλια.Μπορεί να επηρεάσει τη διαδοκασία οινοποίησης. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μεταυλεπτικές χρήσεις:** Λευμόνι, Πορτοκαλιά, Μανταρινι, Νεράντζι, Γκρέιφφρουτ, Πατάτα: 14 ημέρες. Ροδακινιά, Δαμασκινιά, Ελιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Καστανιά: Μη εφαρμοσίμο. Αμπέλι: 21 ημέρες. Πεπόνι (Υ): 7 ημέρες. Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκυθάκι (Υ+Θ): 3 ημέρες. Τομάτα (Υ+Θ) (για νωπή κατανάλωση), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Σκόρδο (Υ), Κρεμμύδι (Υ): 3 ημέρες. Τομάτα (Υ+Θ) (για βιομηχανική χρήση): 10 ημέρες. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αερόζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

|                                | FILL IN |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Country                        | Greece  | Single label              | 130X108          |
| Product SKU                    |         | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        |         | Booklet                   |                  |
| Label SKU                      |         | Number of pages (Booklet) |                  |
| Label SKU Description          |         | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) |         | Reprinted Material        |                  |