



# Carnival™ CE

## Λίπασμα

Για τη διόρθωση τροφωπεινών λόγω ανισορροπίας των μικροθρεπτικών στοιχείων και πρόληψη των δυσλειτουργιών που προκαλεί η έλλειψη ασβεστίου σε μεγάλο εύρος γεωργικών καλλιεργειών, κηπευτικών και οπωροφόρων.

Συμπυκνωμένη υγρή φόρμουλα για εύκολη ανάμιξη και χειρισμό.

### ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(Β)(Ι): ΑΠΛΟ ΥΓΡΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

N (Ca-Mg) λίπασμα 9,3 (+13,8-1,7) με βόριο και ψευδάργυρο

Άζωτο (N): 9,3% β/β (14% β/ο)

Οξείδιο ασβεστίου (CaO): 13,8% β/β (20,7% β/ο)

Οξείδιο μαγνησίου (MgO): 1,7% β/β (2,6% β/ο)

Βόριο (B) διαλυτό στο νερό: 0,05% β/β (0,08% β/ο)

Ολικός ψευδάργυρος (Zn): 0,02% β/β (0,03% β/ο)

Συστατικά: νιτρικό ασβέστιο (CAS no 10124-37-5), νιτρικό μαγνήσιο (CAS no 10377-60-3).

Όλες οι ουσίες ανήκουν στην ΚΣΥ 1. Ουσίες και μείγματα παρθέτων υλικών.

**Να χρησιμοποιείτε μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης.  
Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δόσεις.**

**Φράουλες:** Για τη βελτίωση της σφριγηλότητας των καρπών και την παράταση της διάρκειας ζωής τους. Δόση: 250-500 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμόστε από την αρχή της ανθοφορίας. Επαναλάβετε σε διαστήματα 10-14 ημερών, όπου απαιτείται.

**Καρότα:** Δόση: 500 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: Τουλάχιστον 20 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Κάνετε 2-3 εφαρμογές σε μεσοδιαστήματα 10-14 ημερών, όταν έχει αρχίσει να σχηματίζεται το καρτό.

**Σέλινο:** Δόση: 500 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: Τουλάχιστον 20 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Όσο το δυνατόν νωρίτερα, όταν το νεαρό φυτό έχει αρκετό φύλλωμα για να απορροφήσει το ψευδαργυρικό διάλυμα.

**Μαρούλι υπαίθρου:** Για αποφυγή εγκαυμάτων, εφαρμόστε το ψευδαργυρικό διάλυμα, απευθείας στο φυτό. Η προληπτική θεραπεία είναι απαραίτητη. Μην εφαρμόζετε το λίπασμα Carnival™ στο μαρούλι στο θερμοκήπιο. Δόση: 500 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: Τουλάχιστον 20 κ.εκ/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Ξεκινήστε τις εφαρμογές πριν από το σχηματισμό της κεφαλής και επαναλάβετε κάθε 10 - 14 ημέρες, όπου απαιτείται.

**Πατάτες:** Για τη ρύθμιση έλλειψης του ασβεστίου. Δόση: 500 κ.εκ/στρέμμα, χρησιμοποιήστε αρκετό νερό. Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμόστε όπως απαιτείται και επαναλάβετε μετά από 10 - 14 ημέρες

**Λαχανικά (Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο, κλπ.):** Για την πρόληψη έλλειψης ασβεστίου. Δόση: 500 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: Τουλάχιστον 20


λίτρα/στρέμμα. Χρόνος: Εφαρμόστε στην αρχή της ανάπτυξης των λαχανικών και επαναλάβετε μετά από 7-10 ημέρες.

**Μήλα:** Για την πρόληψη έλλειψης ασβεστίου που προκαλεί διάφορες επιπτώσεις στα δέντρα (σκωριάσεις, σκίσιμο του δέρματος, σκασίμο των καρπών, κλπ.) και μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα αποθήκευσης της καλλιέργειας συνιστάται ψεκασμοί με: Δόση: 200-500 κ.εκ/στρέμμα από τη έκπτυξη των οφθαλμών έως την αρχή της ανθοφορίας με επανάληψη κάθε 7-10 ημέρες. Δόση 500 κ.εκ-1 λίτρο/στρέμμα από την πτώση των πετάλων έως μια βδομάδα πριν τη συγκομιδή και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες. Όγκος ψεκ. υγρού: Τουλάχιστον 20-50 λίτρα/στρέμμα, χρησιμοποιήστε αρκετό νερό. Χρόνος εφαρμογής: Αποφύγετε τον ψεκασμό κατά τη διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών. Ο ψεκασμός να πραγματοποιείται αργά το απόγευμα για την αποφυγή καψίματος.

**Παρατηρήσεις:** Το προϊόν να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει έντονο το ηλιακό φως και θερμοκρασίες άνω των 25°C. Εάν είναι δυνατόν οι ψεκασμοί να γίνονται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα.

**Αποθήκευση:** Προστατέψτε από τον ήλιο. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία πάνω από 5°C. Αποθηκεύστε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο μέρος. Μην το αποθηκεύετε σε απ'ευθείας έκθεση στο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας. Κρατείστε το μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

UFI: 0TYO-T3FM-QN4M-G47E



**Κίνδυνος**

### ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

P264: Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P301+310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**Επικίνδυνα συστατικά:**  
Περιέχει Νιτρικό ασβέστιο.

Περιεχόμενο:  
**1000 λίτρα**

Αριθμός Παρτίδας:  
Ημερομηνία Παραγωγής:



Εισάγεται στην Ευρώπη από: FMC Agricultural Solutions A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Denmark. TEL: 45 (0) 96909690 και διανέμεται στην Ελλάδα από: FMC Χημικά Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε, Α. Συγγρού 348, Τ.Κ: 17674, Καλλιθέα, Τηλ.: 211 198 3903

FMC Agro Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.  
Tel: + 44 (0) 1244 537370 - E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com  
www.fmc-agro.co.uk

Παρασκευάζεται στο  
Ηνωμένο Βασίλειο

Τα FMC, FMC logo και Carnival™ είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή τα θυγατρικών της.  
©2020-2022 FMC Corporation. All rights reserved.

11001441\_22050011\_GREECE