

FMC



Carnival® CE

Λίπασμα

Για τη διόρθωση τροφοπενιών λόγω ανισορροπίας των μικροθρεπτικών στοιχείων και πρόληψη των δυσλειτουργιών που προκαλεί η έλλειψη ασβεστίου σε μεγάλο εύρος γεωργικών καλλιεργειών, κηπευτικών και οπωροφόρων.

Συμπυκνωμένη υγρή φόρμουλα για εύκολη ανάμιξη και χειρισμό.

ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(Β)(Ι): ΑΠΛΟ ΥΓΡΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

N (Ca-Mg) λίπασμα 10 (+15+2) με βόριο και ψευδάργυρο.

Ολικό Άζωτο (N): 10% β/β 15% β/ο

Νιτρικό Άζωτο (N): 10% β/β 15% β/ο

Ολικό οξείδιο του Ασβεστίου (CaO): 15% β/β 22,4% β/ο

Ολικό οξείδιο του Μαγνησίου (MgO): 2% β/β 3% β/ο

Βόριο (B): 0,05% β/β 0,07 β/ο

Ψευδάργυρος ως οξείδιο: 0,02% β/β 0,03 β/ο

Συστατικά: νιτρικό ασβέστιο (CAS no 15245-12-2), νιτρικό μαγνήσιο (CAS no 10377-60-3).

Όλες οι ουσίες ανήκουν στην ΚΣΥ 1. Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών.

Να χρησιμοποιείτε μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης.

Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δόσεις.

Φράουλες: Για τη βελτίωση της σφριγηλότητας των καρπών και την παράταση της διάρκειας ζωής τους. Δόση: 250-500 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμόστε από την αρχή της ανθοφορίας. Επαναλάβετε σε διαστήματα 10-14 ημερών, όπου απαιτείται.

Καρότα: Δόση: 500 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: Τουλάχιστον 20 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Κάνετε 2-3 εφαρμογές σε μεσοδιαστήματα 10-14 ημερών, όταν έχει αρχίσει να σχηματίζεται το καρότο.

Σέλινο: Δόση: 500 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: Τουλάχιστον 20 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Όσο το δυνατόν νωρίτερα, όταν το νεαρό φυτό έχει αρκετό φύλλωμα για να απορροφήσει το ψεκαστικό διάλυμα.

Μαρούλι υπαίθρου: Για αποφυγή εγκαυμάτων, εφαρμόστε το ψεκαστικό διάλυμα, απευθείας στο φυτό. Η προληπτική θεραπεία είναι απαραίτητη. Μην εφαρμόζετε το λίπασμα Carnival® στο μαρούλι στο θερμοκήπιο. Δόση: 500 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: Τουλάχιστον 20 κ.εκ/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Ξεκινήστε τις εφαρμογές πριν από το σχηματισμό της κεφαλής και επαναλάβετε κάθε 10-14 ημέρες, όπου απαιτείται.

Πατάτες: Για τη ρύθμιση έλλειψης του ασβεστίου. Δόση: 500 κ.εκ/στρέμμα, χρησιμοποιήστε αρκετό νερό. Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμόστε όπως απαιτείται και επαναλάβετε μετά από 10-14 ημέρες.

Λαχανικά (Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο, κλπ.): Για την

πρόληψη έλλειψης ασβεστίου. Δόση: 500 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: Τουλάχιστον 20 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος: Εφαρμόστε στην αρχή της ανάπτυξης των λαχανικών και επαναλάβετε μετά από 7-10 ημέρες.

Μήλα: Για την πρόληψη έλλειψης ασβεστίου που προκαλεί διάφορες επιπτώσεις στα δέντρα (σκληρώσεις, σχίσμο του δέρματος, σκάσιμο των καρπών, κλπ.) και μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα αποθήκευσης της καλλιέργειας συνιστάται ψεκασμοί με: Δόση: 200-500 κ.εκ/στρέμμα από τη έκπτυξη των οφθαλμών έως την αρχή της ανθοφορίας με επανάληψη κάθε 7-10 ημέρες. Δόση 500 κ.εκ/λίτρο/στρέμμα από την πτώση των πετάλων έως μια βδομάδα πριν τη συγκομιδή και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες. Όγκος ψεκ. υγρού: Τουλάχιστον 20-50 λίτρα/στρέμμα, χρησιμοποιήστε αρκετό νερό. Χρόνος εφαρμογής: Αποφύγετε τον ψεκασμό κατά τη διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών. Ο ψεκασμός να πραγματοποιείται αργά το απόγευμα για την αποφυγή καψίματος.

Συνιστάται να χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων εδάφους και ιστών όποτε είναι δυνατόν, για την καθοδήγηση των εφαρμογών μικρο και μακρο θρεπτικών συστατικών για τη βελτιστοποίηση της θρεπτικής κατάστασης των καλλιεργειών.

Συνιστάται οι παραγωγοί να ενημερώνονται από τους κατά τόπους γεωπόνους, για την ορθή χρήση της εκάστοτε περίπτωσης και την αποφυγή της υπερβολικής λίπανσης.

Το λίπασμα Carnival® είναι φυσικά και χημικά συμβατό με ένα

ευρύ φάσμα αγροχημικών προϊόντων. Συμβουλευτείτε την προμηθευτή σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Επικοινωνήστε με την εταιρεία ή τον διανομέα της εταιρείας για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες (www.fmc.com).


Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν το ανοίξετε και το χρησιμοποιήσετε. Ο εξοπλισμός ψεκασμού πρέπει να είναι καθαρός. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση. Ξεπλύνετε προσεκτικά το δοχείο, προσθέστε τα ξεπλύματα στο ψεκαστικό δοχείο και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Διατηρήστε την ανάδευση καθ'όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα.

Διαβάστε πάντοτε προσεκτικά την ετικέτα των άλλων προϊόντων πριν από την ανάμιξη με το λίπασμα Carnival®.

Παρατηρήσεις: Το προϊόν να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει έντονο το ηλιακό φως και θερμοκρασίες άνω των 25°C. Εάν είναι δυνατόν οι ψεκασμοί να γίνονται αργά το απόγευμα ή χωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα.

Αποθήκευση: Προστατέψτε από τον πάγο. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία πάνω από 5°C. Αποθηκεύστε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο μέρος. Μην το αποθηκεύετε σε απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας. Κρατείστε το μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

UFI: 0TYO-T3FM-QN4M-G47E



Κίνδυνος

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Επιβάλετε σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως

το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,

εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη

υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις

οδηγίες χρήσης.

Επικίνδυνο συστατικά:

Περιέχει Νιτρικό ασβέστιο.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συμβουλευτείτε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Περιεχόμενο:
1000 λίτρα

Αριθμός Παρτίδας:
Ημερομηνία Παραγωγής:

FMC

Εισάγεται στην Ευρώπη από: FMC Agricultural Solutions A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Denmark. TEL: 45 (0) 96909690 και διανέμεται στην Ελλάδα από: FMC Χημικά Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε, Α. Συγγρού 348, Τ.Κ: 17674, Καλλιθέα, Τηλ.: 211 198 3903 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 455701000

FMC Agro Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.
Tel: + 44 (0) 1244 537370 - E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com
www.fmc-agro.co.uk

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τα FMC, FMC logo και Carnival® είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της.

©2020-2024 FMC Corporation. All rights reserved.

11001441_22054755_GREECE