

FMC

SIMIN™ 2,5 EC

Deltamethrin (Δελταμεθρίνη)
ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για
την αντιμετώπιση μυζητικών και μασσητικών εντόμων.Εγγυμένη σύνθεση: Deltamethrin 2,5% (β/ο),
Βοηθητικές ουσίες: 97,19% (β/β)

ΑΑΔΑ: 14748/23.06.2020

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Περιεχόμενο:

1 Λίτρο e

Αρ. παρτίδος/
Ημερ. παραγωγής:
Βλέπε συσκευασία

Gowan®

Κάτοχος της άδειας:
GOWAN Crop Protection Limited,
Rothamsted Research, West Common,
Harpenden, Hertfordshire, AL5 2JQ,
Ηνωμένο Βασίλειο

5 703265 1571173

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά-
Διανομέας: FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ,
Λ. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα,
Τηλ.: 211 1983903, Φαξ: 211 1138614,
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 455701000

FMC

11005953_11477_GREECE



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και σπμιο εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διεύθυνσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπηλμία ή ζάλη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / φλόγες/ θερμές επιφάνειες- Μην καπνίζετε. Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια. Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά νερά: **-5 μέτρων** για όλες τις υπαίθριες καλλιέργειες εκτός από τις δενδρώδεις και τα αμπέλια ή καθόλου αψέκαστη ζώνη προστασίας με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. **-15 μέτρων** για τις δενδρώδεις καλλιέργειες με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. -Δεν απαιτείται αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά νερά για τα αμπέλια με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** για τις υπαίθριες καλλιέργειες κ.α. καλλιέργειες με ύψος μικρότερο από 50 εκ. (ή καθόλου αψέκαστη ζώνη προστασίας με χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%) από την μη γεωργική γη. Δεν απαιτείται αψέκαστη ζώνη προστασίας από την μη γεωργική γη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, το αμπέλι κ.α. καλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50 εκ. με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάσας μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΕΜΕΤΟ. Πληροφορίες για το γιατρό/θεραπευτικά μέτρα: Επιπτώσεις χειρισμών: Συμπτωματοκή και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια, ενστάλαξη τοπικά αναισθητικών σταγόνων π.χ. 1% amethocaine hydrochloride. Χορηγήστε αναλγητικά αν χρειάζεται. Δεν υπάρχει αντιδοτο. Αντιμετώπιση ασημάτων: Χορηγήστε διάζερα: για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλεβίως. Χορηγήστε όσο χρειάζεται ώστε να ηρεμήσει πλήρως ο παθών. Για παιδιά 2.5mg ενδοφλεβίως.

Αντενδείξεις: ατροπίνη και παράγωγα αδρεναλίνης.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

«Διαβάστε τις
εσώκλειστες οδηγίες»

11005953_11477_ LBL_ML-F_1L_SIMIN 2.5EC_GR_4_BOOKLET_4PAGES

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11005953	Base for Booklet	
Product SKU Description	1L_SIMIN 2.5EC_GR_4_BOOKLET_4PAGES	Booklet	220X120
Label SKU	11477	Number of pages (Booklet)	4
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_SIMIN 2.5EC_GR_4_BOOKLET_4PAGES	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na⁺ στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκεύασμα περιέχει deltamethrin, ένα εντομοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 3Α κατά IRAC. Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, το αμπέλι και άλλες υπαίθριες καλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50cm απαιτείται χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%.

Στρατηγική διαχείρισης ανθεκτικότητας

Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.

Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.

Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.

Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το SIMIN 2,5 EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί

έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ, Νεραντζιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι, Αραβόσιτος, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: **30 ημέρες.**

Μηδική: **14 ημέρες.**

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Λάχανο (εκτός από το κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Καπνός, Φύλλα Σέλινου, Μαϊντανός, Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλια: **7 ημέρες.**

Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μαρούλι, Φράουλα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Ρόκα, Αγκινάρα: **3 ημέρες.**

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Πεδίο εφαρμογής, στόχοι, δόσεις σκευάσματος, τρόπος και χρόνος εφαρμογής, μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο, μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες).

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρούτ, Νεραντζιά): Αφίδες: Δόση 30-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ./στρέμμα). Λεκάριο, Μύγα της Μεσογείου: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα - Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:1

ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά): Αφίδες: Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (42-

50 κ.εκ./ στρέμμα) - Όγκος ψεκ. υγρού: 140 λίτρα/στρέμμα.- Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Καρπόκαψα καρυδιάς, Καρπόκαψα καστανιάς: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (42-50 κ.εκ./στρέμμα). - Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. - Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Ευρύτομο: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρέμμα). - Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. - Ψεκασμός με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο /Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **2/14 ημέρες.**

ΜΗΛΟΕΙΔΗ* (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά): Καρπόκαψα, Αφίδες, Ψύλλα Μηλιάς: Δόση: 30-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100- 140 λίτρα / στρέμμα. Φυλλοδέτες: Δόση: 35κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (35-50 κ.εκ./ στρέμμα).- Όγκος ψεκ. υγρού: 100- 140 λίτρα/στρέμμα. Ψύλλα αχλαδιάς: Δόση: 50κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **2/14 ημέρες**

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά): Φυλλοδέτες, Ανάρσια: Δόση: 35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (35-49 κ.εκ./στρέμμα). Ραγολέπιδα: Δόση: 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (40-70 κ.εκ./ στρέμμα). Μύγα της Μεσογείου: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ. /στρέμμα). Αφίδες, Καρπόκαψα της Δαμασκηνιάς: Δόση: 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ. /στρέμμα).

Όγκος ψεκ. υγρού 100 -140 λίτρα /στρέμμα - Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

ΑΜΠΕΛΙ:** Ευδεμίδα: Δόση α) για την 1η γενιά: 50 κ.εκ. και β) για τη 2η και 3η γενιά: 50-70 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ./στρέμμα). Κογχυλίδα: Δόση: 50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ./στρέμμα). Τζιτζικάκια: Δόση: 50 κ.εκ./100

λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./ στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα / στρέμμα - Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/14 ημέρες.**

ΕΛΙΑ: Δάκος: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ./στρέμμα). Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. Λεκάριο: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ./στρέμμα.). Με την εμφάνιση της προσβολής. Βαμβακάδα: Δόση: 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ./στρέμμα.). Με την εμφάνιση της προσβολής. Πυρηνωτήτης: Δόση α) για την ανθόβια γενιά: 30 κ.εκ /100 λίτρα ψεκ. υγρού και β) για την καρπώβια γενιά: 50 κ.εκ. ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού υγρού (30-70 κ. εκ./στρέμμα). Εφαρμογές στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενιά) και αμέσως μετά την καρπώδεση (καρπώβια γενιά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες.

Όγκος ψεκ. υγρού: 100-140 λίτρα/στρέμμα - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:1

ΦΡΑΟΥΛΑ - Υπαίθρου και Θερμοκηπίου: Αφίδες: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (25-50 κ. εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/14 ημέρες.**

ΒΟΛΒΩΔΗ (Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο): Θρίπας. Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-50 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/14 ημέρες.**

ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα)-Υπαίθρου: Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ. /στρέμμα). Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./ στρέμμα. Βρωμούσα: Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, (18-30 κ.εκ./ στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-100 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την

εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/14 ημέρες.**

Πιπεριά - Θερμοκηπίου: Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-140 λίτρα/στρέμμα. Βρωμούσα: Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, (18-42 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-140 λίτρα /στρέμμα. Αλευρώδης: Δόση: 70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (42-70 κ.εκ./στρέμμα.). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-100 λίτρα /στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **4/7 ημέρες.**

Τομάτα, Μελιτζάνα - Θερμοκηπίου: Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ./στρέμμα.). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-100 λίτρα / στρέμμα. Βρωμούσα: Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, (18-42 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού 60-140 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/7 ημέρες.**

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: (Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι) - Υπαίθρου και Θερμοκηπίου: Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες: Δόση: α) 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα για καλλιέργειες Υπαίθρου β) 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ./στρέμμα): Όγκος ψεκ. υγρού 60-140 λίτρα /στρέμμα για καλλιέργειες Θερμοκηπίου.

Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα για καλλιέργειες Υπαίθρου. -Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/7 ημέρες.**

ΛΑΧΑΝΑ (εκτός από το κινέζικο), ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ: Πιερίδα, Μαμέστρα, Πλούζα, Πράσινο

σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα. Πλουτέλλα: Δόση: 50 κ.εκ./στρέμμα.

- Όγκος ψεκ. υγρού 50 λίτρα / στρέμμα -Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **2/14 ημέρες.**

ΜΑΡΟΥΛΙ -Υπαίθρου: Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Άλτης, Αφίδες: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (25-50 κ.εκ./στρέμμα.).

Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 50 -100 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/7 ημέρες.**

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Μαϊντανός, Φύλλα σέλινου, Ρόκα): Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμέστρα, Άλτης: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (35 κ.εκ. /στρέμμα). Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκ. υγρού 70 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **2/14 ημέρες.**

ΨΥΧΑΝΘΗ-όσπρια (Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια): Πράσινο σκουλήκι, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών . Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **2/14 ημέρες.**

ΜΠΙΖΕΛΙΑ ΦΡΕΣΚΑ (Αρακάς): Αφίδα των μπιζελιών, Σπύνα: Δόση: 25 κ.εκ./στρέμμα. Αφίδα των κουκιών, Κάμπια των μπιζελιών, Θρίπας, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **2/14**

ημέρες.

ΑΓΚΙΝΑΡΑ: Κασσίδα: Δόση: 50 κ.εκ./ στρέμμα. Προντένια, Αφίδες: Δόση: 30-50 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/7 ημέρες.**

ΠΑΤΑΤΑ: Δορυφόρος: Δόση: 50 κ.εκ./ στρέμμα. Σποντόπτερα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκ. υγρού 60 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/14 ημέρες.**

ΒΑΜΒΑΚΙ: Ρόδινο σκουλήκι, Πράσινο σκουλήκι: Δόση: 50-70 κ.εκ./ 50 κ.εκ./στρέμμα. Αλευρώδης, Τζιζικάκια: Δόση: 50 κ.εκ./στρέμμα. Σποντόπτερα, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **2/14 ημέρες.**

ΚΑΠΝΟΣ: Θρίπας, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./ 50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/7 ημέρες.**

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΠΑΝΤΖΑΡΙ: Αφίδες, Μύγα των τεύτων, Άλτης, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 50 λίτρα / στρέμμα. Κασσίδα: Δόση: 50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 50 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Αραβόσιτος*:** Πυραλίδα, Σεζάμια, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ /στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 60 λίτρα /στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/14-21 ημέρες.**

Διαβρώτικα: Δόση: 50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 60

λίτρα /στρέμμα. Μέγιστος αριθμός ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/7-14 ημέρες.**

ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη): Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκ. υγρού 40 - 60 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Μηδική: Αφίδα των μπιζελιών, Σκαθάρι των μπιζελιών, Φυτονόμος: Δόση: 25 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 40 λίτρα στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **2/14 ημέρες.**

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ - Υπαίθρου/Θερμοκηπίου: Αφίδες, Θρίπες: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (25-50 κ.εκ./στρέμμα), Φυλλοδέστες: Δόση: 35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (17,5-35 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα /στρέμμα.

Αλευρώδης: Δόση: 70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./ στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού 70 λίτρα /στρέμμα.

Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/7 ημέρες.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: *ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα Μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 λίτρα/ στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ. εκ. σκευάσματος στο στρέμμα. **Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. ***Η εφαρμογή του προϊόντος SIMIN στον αραβόσιτο οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* sp. και *Sesamia* sp.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της

συσκευασίας: Η απόσυρση ή η καταστροφή του σκευάσματος να γίνεται σε υψικαμίνους που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Οι κενές φιάλες και δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Συνδυαστικότητα: --.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.