

FMC

SIMIN™ 2,5 EC

Deltamethrin (Δελταμεθρίνη)
ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων.

Εγγυημένη σύνθεση: Deltamethrin 2,5% (β/ο),
Βοηθητικές ουσίες: 97,19% (β/β)

ΑΑΔΑ: 14748/23.06.2020

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Περιεχόμενο:
250 κ.εκ. e

Αρ. παρτίδος/
Ημερ. παραγωγής:
Βλέπε συσκευασία

Gowan

Κάνακας της Ελλάδας
GOWAN Crop Protection Limited,
Rothamsted Research, West Common,
Harpenden, Hertfordshire, AL5 2JQ,
Ηνωμένο Βασίλειο



Υπεύθυνος για την τελική διέθεση
στην αγορά FMC Χημικά Ελλάδας METE
Α. Συγγρού 348, κτίριο Β, 17674, Καλλιθέα,
Τηλ.: 211 198 3903, Fax: 211 113 8614

FMC

11005964_10757_GREECE



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και αιχμή εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Πολύ τοξικό για τους υδράβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένα. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μακριά από θερμάπια / σπινθήρες / φλόγες / θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. Αποφεύγετε να αναπνεύετε εκκενώματα. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα στομιακής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. Οι εργαζόμενοι να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδράβιους οργανισμούς να αφησάτε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά νερά: **-5 μέτρων** για όλες τις υπαίθριες καλλιέργειες εκτός από τις δενδρώδεις και τα αμπέλια ή καθόλου αφέκαστη ζώνη προστασίας με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. **-15 μέτρων** για τις δενδρώδεις καλλιέργειες με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. **-Δεν απαιτείται αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά νερά για τα αμπέλια με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%.** Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφησάτε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** για τις υπαίθριες καλλιέργειες κ.α. καλλιέργειες με ύψος μικρότερο από 50 εκ. (ή καθόλου αφέκαστη ζώνη προστασίας με χρήση ακροφυσίων

μειωμένης διασποράς 90%) από την μη γεωργική γη. Δεν απαιτείται αφέκαστη ζώνη προστασίας από την μη γεωργική γη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, τα αμπέλια κ.α. καλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50 εκ. με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδύνους μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

ΠΡΑΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Βγάλτε τα μολυμμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφησάτε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε με άφρονο νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθηθείτε αδύσπασια. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΕΜΕΤΟ. **Πληροφορίες για το γιατρό/θεραπευτικά μέτρα:** **Επιτόπιος χειρισμός:** Συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια, ενστάλαξη τοπικά ανααιθητικών σταγόνων π.χ. 1% amethocaine hydrochloride. Χρησιμοποιήστε αναλγητικά αν χρειάζεται, Δεν υπάρχει αντιδοτό. **Διηλεκτρολύση σταγόνων:** Χορηγήστε diazepam για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλεβίως. Χορηγήστε όσο χρειάζεται ώστε να προμησεί πλήρως ο παθών. Για παιδιά 2,5mg ενδοφλεβίως.

ΑΝΤΙΝΕΩΣΙΣ στατιστική και παρανόνα αδρεναλίνη.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

11005964_10757_LBL_ML-F_250ML_SIMIN 2.5EC_GR_3_BOOKLET_4PAGES

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11005964	Base for Booklet	178X70
Product SKU Description	250ML_SIMIN 2.5EC_GR_3_BOOKLET_4PAGES	Booklet	194X70
Label SKU	10757	Number of pages (Booklet)	4
Label SKU Description	LBL_ML-F_250ML_SIMIN 2.5EC_GR_3_BOOKLET_4PAGES	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυητικών και μασητικών εντόμων. Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεντρώνεται στις διαύλους των ιόντων Na+ στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηαιστεί: Το σκεύασμα περιέχει deltamethrin, ένα εντομοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 3Α κατά IRAC. Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, το αμπέλι και άλλες υπαίθριες καλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50cm απαιτείται χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%.

Στρατηγική διαχείρισης ανθεκτικότητας

Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.

Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.

Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.

Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το SIMIN 2,5 EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέπ-φρούτ, Νεραντζιά, Αμυγδαλιά,

Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Παντζέρι, Αραβόσιτος, Σπύρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη. **30 ημέρες.**

Μηδική: **14 ημέρες.**

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσαμουλιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Λάχανο (εκτός από το κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Καπνός, Φύλλα Σέλινου, Μάϊντανός, Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλια: **7 ημέρες.**
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μαρούλι, Φράουλα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Ρόκα, Αγκινάρα: **3 ημέρες.**

Στοιχεία φυτοδοξότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Πεδίο εφαρμογής, στόχοι, δόσεις σκευάσματος, τρόπος και χρόνος εφαρμογής, μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο, μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες).

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέπ-φρούτ, Νεραντζιά): *Αφίδες:* Δόση 30-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ./στρέμμα). *Δεκάνο, Μύγα της Μεσοασιου:* Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα - Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών -Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:1

ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά): *Αφίδες:* Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (42-50 κ.εκ./ στρέμμα) - Όγκος ψεκ. υγρού: 140 λίτρα/στρέμμα. - Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. *Καρπόκαμα καρυδιάς, Καρπόκαμα καστανιάς:* Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (42-50 κ.εκ./στρέμμα). - Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. - Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. *Ευρώτομο:* Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρέμμα). - Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. - Ψεκασμός με την έναρξη των πτήσεων των ακμιαών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο /Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **2/14 ημέρες.**

ΜΗΛΟΕΙΔΗ* (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσαμουλιά): *Καρπόκαμα, Αφίδες, Ψύλλα Μηλιάς:* Δόση: 30-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100- 140 λίτρα / στρέμμα. *Φυλλοδόττες:* Δόση: 35κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (35-50 κ.εκ./στρέμμα). -Όγκος ψεκ. υγρού: 100- 140 λίτρα/στρέμμα. *Ψύλλα αχλαδιάς:* Δόση: 50κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρέμμα).

Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **2/14 ημέρες**

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά): *Φυλλοδόττες, Ανάσσα:* Δόση: 35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (35-49 κ.εκ./στρέμμα). *Ραγολέπιδες:* Δόση: 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (40-70 κ.εκ. / στρέμμα). *Μύγα της Μεσοασιου:* Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ. /στρέμμα). *Αφίδες, Καρπόκαμα της Δαμασκηνιάς:* Δόση: 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ. /στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού 100 -140 λίτρα /στρέμμα - Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

ΑΜΠΕΛΙ:** *Ευθεμίδα:* Δόση α) για την 1η γενιά: 50 κ.εκ. και β) για τη 2η και 3η γενιά: 50-70 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ./στρέμμα). *Κογχυλίδα:* Δόση: 50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ./στρέμμα). *Τζιζυκάκια:* Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα / στρέμμα - Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/14 ημέρες.**

ΕΛΙΑ: *Δάκος:* Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ./στρέμμα). Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμιαών στις παγίδες. *Δεκάνο:* Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ./στρέμμα.). Με την εμφάνιση της προσβολής. *Βαμβακάδα:* Δόση: 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ./στρέμμα.). Με την εμφάνιση της προσβολής. *Πυρρνοστρήτης:* Δόση α) για την ανθόβια γενιά: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και β) για την καρπόβια γενιά: 50 κ.εκ. ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού υγρού (30-70 κ. εκ./στρέμμα). Εφαρμογές στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενιά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενιά) μεταξύ ωθοσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμιαών στις φερομονικές παγίδες. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-140 λίτρα/στρέμμα - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:1

ΦΡΑΟΥΛΑ - Υπαίθρου και Θερμοκηπίου: *Αφίδες:* Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (25-50 κ. εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση

των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/14 ημέρες.**
ΒΟΛΩΔΗ (Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο): *Θρίπας, Κοφτοσκούληκα:* Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-50 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/14 ημέρες.**

ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα)-Υπαίθρου: *Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες:* Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ. /στρέμμα). *Κοφτοσκούληκα:* Δόση: 30-50 κ.εκ./ στρέμμα. *Βρωμούσα:* Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, (18-30 κ.εκ./ στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-100 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/14 ημέρες.**

Πιπεριά - **Θερμοκηπίου:** *Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος,Αφίδες:* Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ./στρέμμα), Όγκος ψεκ. υγρού: 60-140 λίτρα/στρέμμα. *Βρωμούσα:* Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, (18-42 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-140 λίτρα /στρέμμα. *Αλευρώδης:* Δόση: 70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (42-70 κ.εκ./στρέμμα.), Όγκος ψεκ. υγρού: 60-100 λίτρα /στρέμμα.

Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **4/7 ημέρες.**

Τομάτα, Μελιτζάνα - **Θερμοκηπίου:** *Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες:* Δόση: 50 κ. εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ./στρέμμα.). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-100 λίτρα / στρέμμα. *Βρωμούσα:* Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, (18-42 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού 60-140 λίτρα /στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/7 ημέρες.**

ΚΟΛΟΧΥΘΩΟΕΙΔΗ (Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι) - Υπαίθρου και Θερμοκηπίου: *Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες:* Δόση: α) 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα για καλλιέργειες

Υπταίθρου β) 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ./στρέμμα): Όγκος ψεκ. υγρού 60-140 λίτρα / στρέμμα για καλλιεργείες Θερμοκητίου.
Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα για καλλιεργείες Υπταίθρου.

-Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/7 ημέρες**.

ΛΑΧΑΝΑ (εκτός από το κινέζικο), **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ**, **ΜΠΡΟΚΟΛΟ**: Περίδα, Μαϊέστρα, Πλούζα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα. Πλουτέλλα: Δόση: 50 κ.εκ./στρέμμα.

- Όγκος ψεκ. υγρού 50 λίτρα / στρέμμα -Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **2/14 ημέρες**.

ΜΑΡΟΥΛΙ -Υπταίθρου: Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αλιγς, Αφίδες: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (25-50 κ.εκ./στρέμμα.), Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 50 -100 λίτρα / στρέμμα. Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/7 ημέρες**.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Μαϊντανός, Φύλλα σέλινου, Ρόκα): Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαϊέστρα, Αλιγς: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (35 κ.εκ. /στρέμμα). Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκ. υγρού 70 λίτρα / στρέμμα. Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **2/14 ημέρες**.

ΨΥΧΑΝΘΗ-όσπρια (Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια): Πράσινο σκουλήκι, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών . Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **2/14 ημέρες**.

ΜΠΙΖΕΛΙΑ ΦΡΕΣΚΑ (Αρακάς): Αφίδα των μπαζελιών, Στόνα: Δόση: 25 κ.εκ./στρέμμα. Αφίδα των κουκιών, Κύμια των μπαζελιών, Ορίγας, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα / στρέμμα. Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **2/14 ημέρες**.

ΑΓΚΙΝΑΡΑ: Κασσιίδα: Δόση: 50 κ.εκ./ στρέμμα. Προνένια, Αφίδες: Δόση: 30-50 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα στρέμμα. Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/7 ημέρες**.

ΠΑΤΑΤΑ: Δορυφόρος: Δόση: 50 κ.εκ./ στρέμμα. Σποντόπτερα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 60 λίτρα / στρέμμα. Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/14 ημέρες**.

ΒΑΜΒΑΚΙ: Ρόδινο σκουλήκι, Πράσινο σκουλήκι: Δόση: 50-70 κ.εκ./ 50 κ.εκ./στρέμμα. Αλευρώδης, Τσίτκακκια: Δόση: 50 κ.εκ./στρέμμα. Σποντόπτερα, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα / στρέμμα. Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών.

ΚΑΠΝΟΣ: Ορίγας, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./ 50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/7 ημέρες**.

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, **ΠΑΝΤΖΑΡΙ**: Αφίδες, Μύγα των τεύτλων, Αλιγς, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 50 λίτρα / στρέμμα. Κασσιίδα: Δόση: 50 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκ. υγρού 50 λίτρα / στρέμμα. Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Αραβόσιτος**: Πυραλίδα, Σεζάμια, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 60 λίτρα / στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/14-21 ημέρες**.

Διαβρώτικα: Δόση: 50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 60 λίτρα /στρέμμα. Μέγιστος αριθμός ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/7-14 ημέρες**.

ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη): Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: Δόση: 30-50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 40 - 60 λίτρα / στρέμμα. Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Μηδική: Αφίδα των μπαζελιών, Σκαθάρι των μπαζελιών, Φυτονόμος: Δόση: 25 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 40 λίτρα στρέμμα. Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός

εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **2/14 ημέρες**.

ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΑ - **Υπταίθρου/Θερμοκητίου**: Αφίδες, Ορίγες: Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (25-50 κ.εκ./στρέμμα), Φυλλοδέτες: Δόση: 35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (17,5-35 κ.εκ./στρέμμα), Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα /στρέμμα.

Αλευρώδης: Δόση: 70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./ στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού 70 λίτρα /στρέμμα.

Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **3/7 ημέρες**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ***ΠΡΟΣΟΧΗ**: Στα Μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 λίτρα/στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ. εκ. σκευάσματος στο στρέμμα. **Δεν επιτρέπεται η συκομιδή αμπελοφυλλών στα οποία έχει γίνει χρήση του φωτοπροστατευτικού προϊόντος. ***Η εφαρμογή του προϊόντος SIMIN στον αραβόσιτο οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* sp. και *Sesamia* sp.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση ή η καταστροφή του σκευάσματος να γίνεται σε υψικαμίνους που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Οι κενές φιάλες και δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ζέπλυμα (τα νερά του ζεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Συνδυαστικότητα: --.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

FMC

SIMIN™ 2,5 EC

Deltamethrin (Δελταμεθρίν)
ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασπηκών εντόμων.

Εγγυημένη σύνθεση: Deltamethrin 2,5% (β/ο),
Βοηθητικές ουσίες: 97,19% (β/β)

ΑΑΔΑ: 14748/23.06.2020

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Περιεχόμενο:
250 κ.εκ. e

Αρ. παρτίδος/
Ημερ. παραγωγής:
Βλέπε συσκευασία

Gowan

Κάτοχος της άδειας:
GOWAN Crop Protection Limited,
Rothamsted Research, West Common,
Harpenden, Hertfordshire, AL5 2JQ,
Ηνωμένο Βασίλειο



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά: FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, κτίριο Β, 17674, Καλλιθέα,
Τηλ.: 211 196 3903, Fax: 211 113 8614

FMC

ETICHETTA DI BASE



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και αιμαί εύφλεκτο. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπινότητα ή ζάλη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Φυλάσσετε κλειδωμένα. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πινείτε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. Αποφύγετε να αναπνέετε εκκεφάρια. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. Οι εργαζόμενοι να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην αυλική επιφάνεια.

Οι εργαζόμενοι να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή. Διάθεση περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφιστέ μιαν αμέκαστη ζώνη προστασίας από τα επανακινάκη νερά. **5 μέτρων** για όλες τις υπαίθριες καλλιέργειες εκτός από τις δεινδράδες και τα αμύλια ή καθόλου αμέκαστη ζώνη προστασίας με τη χρήση ακροφυσιών μειωμένης διασποράς 90%. **-15 μέτρων** για τις δεινδράδες καλλιέργειες με τη χρήση ακροφυσιών μειωμένης διασποράς 90%. **-Δεν απαιτείται αμέκαστη ζώνη προστασίας από τα επανακινάκη νερά για τα αμύλια με τη χρήση ακροφυσιών μειωμένης διασποράς 90%. Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρώποδα να αφιστέ μιαν αμέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για τις υπαίθριες καλλιέργειες κ.α. καλλιέργειες με ύψος μικρότερο από 50 εκ. (ή καθόλου αμέκαστη ζώνη προστασίας με χρήση**

ακροφυσιών μειωμένης διασποράς 90%) από την μη γεωργική γη. Δεν απαιτείται αμέκαστη ζώνη προστασίας από την μη γεωργική γη για τις δεινδράδες καλλιέργειες, το αμύλι κ.α. καλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50 εκ. με τη χρήση ακροφυσιών μειωμένης διασποράς 90%.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάσας μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφιστέ τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε με άφρονο νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφιστέ τους, εφόσον είναι ευκόλο, συνεχίστε να ξεπλύνετε. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανάτε αδυναμία. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΕΜΕΤΟ.

Πληροφορίες για το νιτρο/θερμακινάκη μέτρα: **Επιπρόσθετος χειρισμός:** Συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια, ενσταλάξτε τοπικά ανακουφάκη σταγονών π.κ. 1% αμειλοσάινη hydrochloride. Χρησιγήστε αναλγητικά αν χρειάζεται. Δεν υπάρχει αντίδοτο. **Αντιμετώπιση απαρών:** Χρησιγήστε diazepam για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλέβιας. Χρησιγήστε, όσο χρειάζεται, ώστε να ρεσιμείσει πλήρως ο παθόν. Για παιδιά 2,5mg ενδοφλέβιας.

Αντινεόλλεξας: οτροπίνη και παρώνη αδρεναλίνης.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777