

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Καλλιέργειες - στόχοι - δόσεις - χρόνος & τρόπος εφαρμογής):

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Φράπια): Εναντίον της Κόκκινης ψώρας (*Aonidiella aurantii*), του Ψευδοκόκκου (*Planococcus citri*), του Λεκανίου (*Saissetia oleae*), της Άσπρης ψώρας (*Aspidiotus nerii*), της Μαύρης ψώρας (*Parlatoria zizyphi*), άλλα κοκκοειδή (*Chrysomphalus dictyospermi*, *Pericarya purchasi*, *Ceroplastes rusci*, *C. Sinensis*, *Mytilococcus beckii*, *Coccus hesperidum*) και εναντίον του Αλευρώδη (*Dialeurodes citri* και *Aleurothrix floccosus*) με δόση 1000-1500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (2000-4500 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 200-300. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πριν την αλλαγή του χρωματισμού των καρπών έως το στάδιο όπου τα φρούτα έχουν αποκτήσει το 90% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 79). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1-2/10.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά): Εναντίον της Ψώρας Σαν Ζοζέ (*Quadraspidiotus perniciosus*), της Παρλατόριας (*Parlatoria oleae*), της Βαμβακάδας (*Pseudaulacaspis pentagona*), της Μυτιλόμορφης ψώρας (*Lepidosaphes ulmi*), της Σταχτιάς ψώρας (*Epidiaspis leperii*), των Ακάρεων (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*, *Bryobia rubrioculus*), των Αφιδίων (*Eriosoma lanigerum*, *Aphis pomi*, *Dysaphis pyri*, *D. Plantaginea*) με δόση 750-1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (600-1000 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 80-100. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί μέχρι την άνθηση (πριν το άνοιγμα των λουλουδιών) (BBCH 59). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηλιά): Εναντίον της Ψώρας Σαν Ζοζέ (*Quadraspidiotus perniciosus*), της Βαμβακάδας (*Pseudaulacaspis pentagona*), του Σφαιρολεκάνιου (*Sphaerolectanium prunastri*), της Παρλατόριας (*Parlatoria oleae*), της Μυτιλόμορφης ψώρας (*Lepidosaphes ulmi*), των Αφιδίων (*Myzus persicae*, *Aphis sp.*) και των Ακάρεων (*Tetranychus sp.*, *Bryobia praeliosa*, *Aculus sp.*) με δόση 750-1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (600-1000 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 80-100. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί μέχρι την άνθηση (πριν το άνοιγμα των λουλουδιών) (BBCH 59). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1.

ΜΠΑΝΑΝΑ: Εναντίον της Κόκκινης ψώρας (*Aonidiella aurantii*), του Ψευδοκόκκου (*Planococcus citri*), του Λεκανίου (*Saissetia oleae*), της Άσπρης ψώρας (*Aspidiotus nerii*), της Μαύρης ψώρας (*Parlatoria zizyphi*), άλλα κοκκοειδή (*Chrysomphalus dictyospermi*, *Pericarya purchasi*, *Ceroplastes rusci*, *C. Sinensis*, *Mytilococcus beckii*, *Coccus hesperidum*) και εναντίον του Αλευρώδη (*Dialeurodes citri* και *Aleurothrix floccosus*) με δόση 1000-1500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (800-1500 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 150-300. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πριν την αλλαγή του χρωματισμού των καρπών έως το στάδιο όπου τα φρούτα έχουν αποκτήσει το 90% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 79). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1.

Παρατηρήσεις: 1) Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής. 2) Κατά τη χρήση του σκευάσματος τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. 3) Οι εφαρμογές είναι πιο αποτελεσματικές όταν γίνονται κατά τη διάρκεια των σταδίων διαχείμασης των εντόμων και των αυγών.

Οδηγίες Χρήσης:

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με ψεκαστικές κοινοί όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μηκέ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλάκτωμα και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο

αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή, ο εξοπλισμός πρέπει να ξεπλένεται με άφθονο νερό και απορρυπαντικό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως οι φιάλες με τρύπημα και τα κουτιά με σκίαση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμιαία, κινητές μορφές και αυγά.

Συνδυαστικότητα: --.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία paraffin oil, η οποία δεν έχει εξειδικευμένο τρόπο δράσης. Δεν αναμένεται ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 1) Αποφεύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα και σε περιόδους έντονης ξηρασίας. 2) Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32 °C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας. 3) Να μην γίνεται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας. 4) Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 40 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου. 5) Στα μηλοειδή και ειδικά στο κρουσάλλι να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή Captan, Folpet, Duvitπροενώσεων, σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην καλλιέργεια πριν στεγνώσει το προϊόν.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις χρήσης του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Για όλες τις καλλιέργειες δεν έχει εφαρμογή.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Πρώτες Βοήθειες - Αντιδοτα:

Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα: Ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

LEER BIEN: Es obligatorio para continuar con la impresión de la etiquetas, devolver este documento sellado y firmado despues de comprobar que todo el arte final es correcto, de lo contrario no se fabricarán las etiquetas.

COLORES	MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	SALIDA	TOPO	REFERENCIA / VERSIÓN / FECHA	FIRMA Y SELLO
<p>NEGRO</p> <p>Línea de Troquel NO se IMPRIME</p>	<p>Polietileno Blanco</p>	<p>145 ARANDELA 76</p>	<p>Salida: 8</p>	<p>NO</p>	<p>Sin fabricar Ref. : Nueva BA1 - 19/09/23 Indicar esta referencia para futuras impresiones</p>	<p>FIRMA Y SELLO</p>