



# EXIREL® 10 SE

Cyantraniliprole  
(Σιαντρανιλιπρόλ) 10 % β/ο



Ομάδα 28 Εντομοκτόνο

ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ ΑΙΩΡΗΜΑ (SE)  
Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην αγορά:  
14883/10.10.2024

Εγγυημένη σύνθεση: Cyantraniliprole 10 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 89,15 % β/β

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες  
Κάτοχος της άδειας / Υπεύθυνος για την τελική διάθεση  
στην αγορά:

FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ, Λ. Συγγρού 348, Τ.Κ: 17674  
Καλλιθέα, Τηλ.: 211 198 3903

ΑΡ.ΓΕΜΗ:455701000

Αρ. παρτίδας/Ημ. Παραγωγής: Βλέπε συσκευασία

Τα FMC, FMC logo και Exirel®10 SE είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της. ©2024 FMC Corporation. All rights reserved.

Περιεχόμενο: **1 λίτρο e**



UFI: 325X-J21W-PN4U-F7PG

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Πολύ τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Περιέχει **1,2-benzisothiazole-3(2H)-one**.

## Δηλώσεις Προφύλαξης:

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποφύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή φοράτε μακρομικρο ποικαμίο, μακρύ παντελόνι και γάντια». Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή την συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, το προϊόν να εφαρμόζεται κάθε τρία χρόνια για τα εσπεριδοειδή, την ελιά, το αμπέλι την κερασία και τη ροδακινιά.

Για την προστασία των **υδρόβιων οργανισμών**, να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τα **εσπεριδοειδή**, την **ελιά**, την **κερασιά** και τη **ροδακινιά**.

Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας:

- 5 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 95% ή 10 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% **για τα εσπεριδοειδή, την κερασία και τη ροδακινιά**.

- 5 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 95% **για την ελιά**.

-10 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50% ή 5 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% **για την καλλιέργεια του αμπελιού**.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

## Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε το δοχείο ή την ετικέτα).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλυθείτε με άφθονο νερό λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής.

Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας συμβουλευτεί σχετικά ο γιατρός ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.



11000155\_22064664\_GREECE



3 576960 065788 >

P. 7417 P. 032 CYAN MAGENTA JAUNE NOIR



	FILL IN		DIMENSION (WxH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11000155	Base for Booklet	
Product SKU Description	EXIREL 10SE_1L_GR	Booklet	244x130 mm
Label SKU	22064664	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_EXIREL 10SE_GR_2	Carton label	
Label SKU (earlier version)	22048951	Preprinted Material	No

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος στα εσπεριδοειδή και την ελιά. Στο αμπέλι ο ψεκασμός να γίνεται στη ζώνη των τσαμπιών.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση. Το σκεύασμα είναι ευδιάλυτο στο νερό και δεν απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση. Γεμίστε το βυτίο με νερό ως τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Διαλύστε καλά με ανάδευση και απογεμίστε το βυτίο. Διενεργήστε τον ψεκασμό υπό ανάδευση. Εάν το τελικό ψεκαστικό διάλυμα έχει pH >8 προσθέστε ρυθμιστή pH ώστε το pH να είναι στο 7 ή μικρότερο ή χρησιμοποιήστε το ψεκαστικό διάλυμα εντός 4 ωρών. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Για τον καθαρισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαριστικό ψεκαστικών μέσων ή αμμωνία. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

**Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:**

Το προϊόν είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για τον έλεγχο μυζητικών και μασητικών εντόμων σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών. Ανάλογα με τον εχθρό μπορεί να έχει ακμαιοκτόνο, προνυμφοκτόνο και ωκυτόνο δράση. Πρόκειται για διασυστηματικό εντομοκτόνο με αποπλαστική και διελασματική κίνηση. Εφαρμοζόμενο στο φύλλωμα μειώνει άμεσα τις προσβολές των εντόμων και έμμεσα τη μετάδοση ασθενειών από τα έντομα. Περιέχει την δραστική ουσία cyantraniliprole, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχών ρυανοδίνης των εντόμων. Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση ασβεστίου από τις εσωτερικές αποθήκες των μυών των εντόμων, με άμεσο αποτέλεσμα την μειωμένη μυϊκή λειτουργία, παράλυση, ταχεία παύση της διατροφής του εντόμου (αντιτροφική δράση) και ακολούθως θανάτωση των εντόμων-στόχων.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:**

Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. cyantraniliprole, η οποία ανήκει στην ομάδα 28 κατά IRAC.

Δεν απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής αν βρέξει 2 ώρες μετά τον ψεκασμό.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το προϊόν να εφαρμόζεται με εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

· Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εχθρών/ στόχων έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

· Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

**Φάσμα δράσης:****Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Πράσινα λεμόνια (lime).**

Εναντίον του Λεπιδόπτερου (*Prays citri*) με δόση 25-50 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-200. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών. Από την έκπτυξη των βλαστών έως πριν την διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών (BBCH 31-50). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

Εναντίον του Λεπιδόπτερου (*Phyllocnistis citrella*) με δόση 40-74 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-185. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από την έκπτυξη των βλαστών έως πριν την διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών (BBCH 31-50). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

Εναντίον των Αφίδων (*Aphis spiraecola*, *Aphis gossypii*) με δόση 74 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 74-99. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από το στάδιο όπου είναι ορατές οι κορυφές των φύλλων στους οφθαλμούς έως την πλήρη ανάπτυξη των βλαστών (BBCH 09-39). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

Εναντίον του Θρίπα (*Pezothrips kellyanus*) και για χρήσεις ήσσονος σημασίας για Αλευρώδη\*\* (*Parabemisia myricae*), Ψύλλα των εσπεριδοειδών\*\* (*Trioza erytreae*), Μαύρο ακανθώδη αλευρώδη\*\* (*Aleurocanthus spiniferus*) με δόση 74 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 74-99. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από την διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών έως την καρπόδεση (BBCH 51-71). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

**Ελιά:** Εναντίον του Λεπιδόπτερου (*Prays oleae*) με δόση 20-35 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 70-175. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών. Από το στάδιο όπου οι ανθοφόροι οφθαλμοί είναι ακόμα κλειστοί έως την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 50-81). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά τρία χρόνια (με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες).

**Αμπέλι οينوποιήσιμο:** Εναντίον του Λεπιδοπτέρου (*Lobesia botrana*) με δόση 34 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 57-68. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός στην ζώνη των τσαμπιών στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών. Από την καρπόδεση (οι νεαροί καρποί αρχίζουν να διογκώνονται, τα υπολείμματα των λουλουδιών χάνονται) μέχρι το μαλάκωμα των ρωγών (BBCH 71-85). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

**Κερασιά\*** (Χρήση ήσσονος σημασίας): Εναντίον της Δροσόφιλα (*Drosophila suzukii*) και της ραγολέτιδας (*Rhagoletis cerasi*) με δόση 74 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 74-99. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Από το στάδιο όπου ο καρπός έχει αποκτήσει το 90% του μεγέθους του έως την ωρίμαση των καρπών (BBCH 79-87). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

**Ροδακινιά:** Για χρήση ήσσονος σημασίας: Εναντίον της Δροσόφιλα\* (*Drosophila suzukii*) με δόση 74 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 74-99. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Από το τέλος της άνθησης έως την ωρίμαση των καρπών. BBCH 69-87. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

#### Παρατηρήσεις:

- 1) Μην εφαρμόζετε όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό καταπόνηση.
- 2) Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει και τη φράπα.
- 3) Η χρήση στη πορτοκαλιά περιλαμβάνει και το περγαμόντο, τη νεραντζιά και το σαγκουίσι.
- 4) Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει και το κιτρολέμονο.
- 5) Η χρήση στη μανταρινιά περιλαμβάνει και τις κλημεντίνες, τη σατσούμα και τις ταγγερίνες.

\* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της ροδακινιάς και της κερασιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

\*\* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του αλευρώδη, της ψύλλας των εσπεριδοειδών και του μαύρου ακανθώδη αλευρώδη στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:** - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.

UFI: 325X-J21W-PN4U-F7PG

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **Περιέχει 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one.**

#### Δηλώσεις Προφύλαξης:

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επαπεισόδου στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή φοράτε μακρυμανικό πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια». Διάθεση του περιεχομένου/περιεκτή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή την συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, το προϊόν να εφαρμόζεται κάθε τρία χρόνια για τα εσπεριδοειδή, την ελιά, το αμπέλι την κερασιά και τη ροδακινιά.

Για την προστασία των **υδρόβιων οργανισμών**, να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τα **εσπεριδοειδή**, την **ελιά**, την **κερασιά** και τη **ροδακινιά**.

Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας:

- 5 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 95% ή 10 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% **για τα εσπεριδοειδή, την κερασιά και τη ροδακινιά.**
- 5 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 95% **για την ελιά.**
- 10 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50% ή 5 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% **για την καλλιέργεια του αμπελιού.**

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.



**Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**

Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε το δοχείο ή την ετικέτα).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλυθείτε με άφθονο νερό λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά.

Απομακρύνετε τους φακούς επαφής. Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας συμβουλέψει σχετικά ο γιατρός ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.**

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:**

Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Πράσινα λεμόνια-lime, Φράπα, Περγαμόντο, Νεραντζιά, Σαγκουίνι, Κιτρολέμονο, Κλημεντίνες, Σατσούμα, Ταγγερίνες, Κερασιά, Ροδακινιά: 7 ημέρες. Ελιά: 14 ημέρες. Αμπέλι (οινοποιήσιμο): 10 ημέρες.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Τα FMC, FMC logo και Exirel®10 SE είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της. ©2024 FMC Corporation. All rights reserved.