

FMC

Apache® Max

Abamectin (Αμπαμεκτίν) 2,61 % β/ο

**ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΩΡΗΜΑ (SC)**

**Νηματωδοκτόνο για καλλιέργειες
κηπευτικών θερμοκηπίου**

Εγγυημένη σύνθεση: abamectin 2,61 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 97,3 % β/β

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 3076/24.10.2022

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες

**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Κάτοχος της άδειας:
Albaugh TKI d.o.o.
Grajski trg 21
SI-2327 Rače, Σλοβενία



Περιεχόμενο: **1 Λίτρο e**

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά-
Διανομέας: FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ,
Λ. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα,
Τηλ.: 211 1983903, Φαξ. 211 1138614, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 455701000

ΠΡΟΣΟΧΗ



Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο νευρικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη και φόρτωση του σκευάσματος στο σύστημα στάγδην άρδευσης» «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας». Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). «Οι βομβίνοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως επικονιαστές πριν στεγνώσει η περίσσεια νερού από την στάγδην άρδευση στην επιφάνεια του εδάφους».

Τα FMC, FMC logo είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της. ©2024 FMC Corporation. All rights reserved

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες ANOIETE ΕΔΩ

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογή στο έδαφος μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης. Η συνιστώμενη δόση του σκευάσματος προστίθεται στο σύστημα άρδευσης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ---.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Το τελευταίο 1/3 του συνολικού όγκου νερού χρησιμοποιείται προκειμένου να πλυθούν οι σωλήνες του συστήματος στάγδην άρδευσης. Αδειάστε τελείως το βυτίο του συστήματος άρδευσης, πλύνετε το με νερό και απορρυπαντικό και ξεπλύνετε το τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική *abamectin*, η οποία ανήκει στην ομάδα N-2 κατά IRAC Nematode Working Group. Συνιστάται η εναλλαγή με νηματωδοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Νηματωδοκτόνο για χρήση μέσω στάγδην άρδευσης σε καλλιέργειες κηπευτικών θερμοκηπίου. Προορίζεται για τον έλεγχο φυτοπαρασιτικών νηματωδών του γένους *Meloidogyne* (κομβονηματώδεις). Περιέχει τη δ.ο. *abamectin*, η οποία είναι ανταγωνιστής του GABA (γ-αμινοβουτυρικού οξέος). Δρα κυρίως με επαφή και μέσω της συνεχούς ενεργοποίησης της ροής ιόντων χλωρίου προκαλεί μη αναστρέψιμη παράλυση στους νηματώδεις, με αποτέλεσμα να σταματούν να τρέφονται, να μην είναι πλέον ικανοί να μολύνουν τις ρίζες των φυτών και να πεθαίνουν.

Φάσμα δράσης (Πεδίο εφαρμογής- στόχοι- δόσεις σκευάσματος- τρόπος και χρόνος εφαρμογής- μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες):

Σε **Τομάτα (Θ), Πιπεριά (Θ), Μελιτζάνα (Θ):** Εναντίον του *Meloidogyne incognita* με δόση 400 κ.εκ/στρέμμα.

Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 1000-3000.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πριν τη μεταφύτευση (2 ημέρες), εφαρμογή μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης από την έκπτυξη του 2^{ου} πραγματικού φύλλου έως τη συγκομιδή (BBCH 12-89).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 6 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα.

Σε **Αγγούρι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Πεπόνι (Θ):** Εναντίον του *Meloidogyne incognita* με δόση 400 κ.εκ/στρέμμα.

Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 1000-3000.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πριν τη μεταφύτευση (2 ημέρες), εφαρμογή μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης από την έκπτυξη του 2^{ου} πραγματικού φύλλου έως τη συγκομιδή (BBCH 12-89).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 4 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα.

Παρατηρήσεις: 1). Χρησιμοποιείστε όγκους νερού από 1000-3000 λίτρα στο στρέμμα, που αρκούν για να διαβραχεί το έδαφος (1/3 του συνολικού όγκου), για την κατανομή του προϊόντος στη ζώνη εδάφους όπου αναπτύσσονται οι ρίζες (1/3) και να πλυθούν οι σωλήνες του συστήματος στάγδην άρδευσης (1/3). Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα νερού, καθώς μπορεί να μειώνεται η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος. 2). Αποφύγετε την εφαρμογή του σκευάσματος σε πολύ ξηρές συνθήκες και σε πολύ ξηρό έδαφος.

Στοιχεία φυτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Πεπόνι (Θ): 0 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Ή ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ενδύματα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευθείτε/ επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα καλά με νερό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροϊκού οξέος.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777